

Учебная практика 24

Р "Мужская половая система"

✓ Яички (-семенники = тестисы)

Парное мужские половые железы. Расположены в мошонке

Строение

- Фиброзная наружная оболочка
- Внутренняя паранхимная - из кубич. клеток

Мед. кубич. клетки - клетки Лейдига, секретируют половые гормоны - тестостерон

Функции

- Эндокринная: образ-ие сперматозоидов
- Эндокринная: секретирование половых гормонов

✓ Вспомогат. железы

Небольшие парные тела, прилегающие к заднему краю яичек. В-е секреторные - из кубич. клеток. Секреты имеют белковую природу. Функции: резервуар для накопления сперматозоидов, секрет в-е, рождающихся сперматозоидов

✓ Селезеночный проток

Варное отверстие, диаметр около 50 см, диаметр 1 см.
16-го проток с селезенкой проток приоткрывается
и открывается у левого желудка в проток
селезенки. Селезенка имеет 4:
случайно; множественный и артериальный отдел
Функции: самовосстановление крови.

✓ Селезеночный проток

Варное отверстие, диаметр около 15 см

Основания:

- Селезеночный - образует множественные оклады,
его клетки секреторная выделяет секрет желтого
цвета, и он 26-го клеточности сфинктера.
- множественный отдел (хорошо развит)
- соединительнотканная - состоит из 2-х ветвей,
секрет, питательная сфинктер (хорошо);
множественный отдел сфинктера-ов.

✓ Селезеночный проток

Проток (диаметр ок 2 см) от левого желудка

самостоятельно прогона с выработкой
прогона с помощью профитов до момента от
касаются факторы наивысшего профитного
Факторы: самостоятельные пути

✓ Предотвращение пожара (протекта)
Непрерывное измерение-математический анализ (2х3м)
Безопасность. Нормативные показатели профитов
По фактору-кассетам. Составляет из кассет
свой парониксисом и из-за микров-объектов
Факторы: - изобретения (секретная информация)
нов)

- самостоятельная информация секретов-об
- разработка секретного анализа информации

✓ Куперова кассета:

Вариант оккупации альвеолярно-фундамент
кассета. Величина с горющими. Окружа
ются в математическом анализе

Факторы: самостоятельная работа секрет
интерпретация анализа информации в математическом анализе
прогнозирование секретов

Менная половая система?

V Яичники

Формы органов половой: форма вложенного
малого тела, Яичники фиксированы
Брюшной и с помощью сосудов и лимфы
кровен соединены с маткой

Строение: * однослойный эпителиальный

* соединительная ткань фолликул

* корковое в-во: соединительная ткань с фолликулами

* мозговое в-во: соединительная ткань с кровеносными
сосудами

Функции: * эндокринная: вырабатывает гормоны

* эндокринная: секреторная ткань половых
гормонов (эстрогенов)

VII Маточная (фаллопиева) труба

Труба полая трубка, соединяющая матку
с яичником. Длина мат-ой трубы - 12 см,
диаметр просвета - 1 см

Функция - перемещение яйцеклетки из яичника
в полость матки
✓ ориентированная к яичнику

✓ Матка

белый орган, шаровидно-феррис (5x8 см)
расположенный в матке между передней
кишкой и мочевым пузырем. Матка имеет
узкую часть - шейку, и 2 рога - рога матки -
маточные трубы

Венка состоит из 3-х слоев

- слизистая оболочка (эндометрий)
- мышечная оболочка (миометрий)
- серозная оболочка (периметрий)

Функции - вынашивание плода
- родовая деятельность

✓ Влагалище

Трубка (10-15 см) в полости малого таза

Слизистая оболочка богата клетками

Ткань - в основном к-та, но содержат ред
поддерживают нормальную микрофлору

Функции: среда для поддержания

микрофлоры - на сперматозоидах

и больше и много параситов:

бариты слезли воды, жаривые вода в
всплывае.

Функции: максимальная защита от паразитов

✓ Баритовый песок

баритовый песок превращает в паразитов
(используется для обеззараживания воды от паразитов)

Функции: убивающие паразитов в воде

✓ Кислород

Кислород паразитов параситов от паразитов,

содержит много воды и паразитов от паразитов

Функции: секретарский клуб-ть

✓ Кислоты формируют паразитов паразитов
и параситов параситов-термостат

и клетки паразитов паразитов -
протекторы (параситов параситов)

frees

1 6

2 1

3 2

4 4

5 2

6 2

7 1-4, 2-1, 3-2, 12 8

4-3, 5-5

8-3

9-2

10 1-3

2-4

3-2

4-1

11 3

13 3

14 1

15 2