

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фармацевтический колледж

ДНЕВНИК

Производственной практики по профессиональному модулю:
«Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»

Междисциплинарный курс «Сестринская помощь при различных заболеваниях
и состояниях»

Дисциплина «Сестринский уход за больными детьми различного возраста»

студента (ки) 3 курса 310 группы
специальности 34.02.01.Сестринское дело

Пинчук Наталья Олеговны

База производственной практики: КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
центр охраны материнства и детства» ул. Академика Киренского, 2а

Руководители практики:

Общий руководитель: Кустова Наталья Ивановна

Непосредственный руководитель: Шмарова Ольга Валерьевна (отделение
раннего возраста) Киселева Марина Валерьевна (отделение старшего возраста)

Методический руководитель: Филенкова Надежда Леонидовна



Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись												
21.06	Непосредственный руководитель: <u>Шмарова Ольга Валерьевна</u> Шестой день. Сегодня я проводила сбор сведений о больном ребёнке. Выполняла введение капель в глаза, и пеленание. Алгоритм введения капель в глаза: Этапы: Подготовка к процедуре: 1) Подготовить необходимое оснащение. 2) Вымыть и осушить руки. 3) Подогреть лекарственное вещество до комнатной температуры. 4) Отдельными стерильными ватными шариками, смоченные водой промыть глаза ребёнка в направлении от наружного угла глаза к внутреннему. Выполнение процедуры: 1) Набрать в пипетку лекарственное вещество (левой рукой с помощью сухого ватного шарика оттянуть вниз нижнее веко). 2) Взять пипетку в правую руку и под углом 45 градусов на расстоянии 1-2 см нажать на колпачок пипетки и выпустить 1-2 капли в нижний свод конъюнктивы в наружный угол. Завершение процедуры: 1) Избыток капель при закрытии глаза снять ватным шариком. 2) Вымыть и осушить руки. <table border="1" data-bbox="221 1396 1128 1617"> <thead> <tr> <th>Итог дня:</th> <th>Выполненные манипуляции</th> <th>Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Введение капель в глаза</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Пеленание</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Сбор сведений о больном ребёнке</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество		Введение капель в глаза	1		Пеленание	1		Сбор сведений о больном ребёнке	1		5
Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество													
	Введение капель в глаза	1													
	Пеленание	1													
	Сбор сведений о больном ребёнке	1													



Подпись общего руководителя _____

Подпись непосредственного руководителя _____

Подпись студента _____

Рецепты на лекарственные средства, используемые в отделении

1. Rp.: Susp. Ibuprofeni 20-100 ml D.S. Внутрь по 5 мл 3 раза в сутки.	2. Rp.: Sol. Fenistili 0,1% - 20 ml D.S. По 3-10 капель 3 раза в день.
3. Rp.: Emuls. Simethiconi 10-30 ml D.S. По 15 капель 2 раза в сутки.	4. Rp.: Sir. Paracetamoli 100 ml D.S. Применять внутрь по 1-2 мерной ложки 3 раза в сутки.
5. Rp.: Sol. Athercid-DF 20%-10 ml D.S. Мажете ранки, царапины, по 1 капле 3 раза в день.	6. Rp.: Aer. Aquator Soft 125 ml D.S. По 2 впрыскивания в каждую носовую полость 4 раза в сутки.
7. Rp.: Sol. Vigantoli 1%-1 ml D.S. По 1 капле ежедневно.	8. Rp.: Ung. Panthenoli 5%-50 g D.S. 1 раз в день тонким слоем смазывать на пораженные участки кожи.
9. Rp.: Sir. Herbion plantain syrup 150 ml D.S. Приемность по 1 чашке 3 раза в сутки.	10. Rp.: Sir. Altheae 150 ml D.S. По 1 столовой ложке 4 раза в день.
11. Rp.: Pulv. Baneocinum 10,0 D.S. Наружно, порошок наносит тонким слоем на пораженные участки 2-4 раза в день.	12. Rp.: Sol. Stomatidin 0,1%-200 ml D.S. Полоскать ротовую полость по 10-15 мл 5-6 раз в сутки, не разводить.

Дата	Содержание работы	Оценка	Подпись												
28.06	Непосредственный руководитель: <u>Киселева Марина Валерьевна</u> Шестой день. Проводила сбор сведений о больном ребёнку, наблюдала за осуществлением забора крови для биохимического исследования. Занималась разведением и введением антибиотиков. Разведение антибиотиков: В педиатрической практике чаще используют разведение в соотношении 2:1, то есть на каждые 100 000 ЕД антибиотика, берется 0,5 мл растворителя. Таким образом в приготовленном растворе в 1 мл содержится 200 000 ЕД. антибиотика. В случае небольших доз лекарственного вещества возможно использование разведения 1:1, то есть на каждые 100 000 ЕД. антибиотика, берется 1 мл растворителя (а в растворе в 1 мл содержится 100 000 ЕД антибиотика). Введение антибиотиков: 1) Уложить пациента. Обработать верхний наружный квадрант ягодицы 70% этиловым спиртом, двумя шариками (большое и малое поле). 2) Левой рукой собрать кожу и мышцу в складку. 3) Ввести иглу в мышцу под углом 90° оставив, 2-3 мм на поверхности кожи. 4) Извлечь иглу, прижать место инъекции стерильным шариком, смоченным 70% спиртом. Сделать легкий массаж места инъекции, не отнимая ваты от кожи. 5) Спросить о самочувствии. Провести дезинфекцию. 6) Вымыть и осушить руки. <table border="1" data-bbox="185 1411 1136 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="185 1411 304 1507">Итог дня:</th> <th data-bbox="304 1411 921 1507">Выполненные манипуляции</th> <th data-bbox="921 1411 1136 1507">Количество</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="185 1507 304 1549"></td> <td data-bbox="304 1507 921 1549">Разведение антибиотиков</td> <td data-bbox="921 1507 1136 1549">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="185 1549 304 1633"></td> <td data-bbox="304 1549 921 1633">Забор крови для биохимического исследования</td> <td data-bbox="921 1549 1136 1633">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="185 1633 304 1680"></td> <td data-bbox="304 1633 921 1680">Сбор сведений о больном ребёнке</td> <td data-bbox="921 1633 1136 1680">1</td> </tr> </tbody> </table>	Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество		Разведение антибиотиков	1		Забор крови для биохимического исследования	1		Сбор сведений о больном ребёнке	1		57071 Киселева
Итог дня:	Выполненные манипуляции	Количество													
	Разведение антибиотиков	1													
	Забор крови для биохимического исследования	1													
	Сбор сведений о больном ребёнке	1													



Подпись общего руководителя _____

Подпись непосредственного руководителя _____

Подпись студента _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Рецепты на лекарственные средства, используемые в отделении

1. Rp.: Tabl. Aminophyllini 0,15 D.t.d.N. 10 S. По 1 таблетке 3 раза в сутки.	2. Rp.: Tabl. Metoxycami 0,0075 D.t.d.N. 20 S. По 1 таблетке 4 раза в день во время еды.
3. Rp.: Tabl. Nimesulidi 0,1 D.t.d.N. 10 S. По 1 таблетке 2 раза в день.	4. Rp.: Sol. Diclofenaci 2,5% - 3ml D.t.d.N. 15 in amp. S. Вводить по 3 мл 2-3 раза в день, предварительно развести в 9,9% р-ра изотонического раствора.
5. Rp.: Sol. Prednisoni 3% - 1ml D.t.d.N. 10 in amp. S. Вводить 6/6 по 1 мл ежедневно с 25.00 до 0,9% р-ра изотонического раствора.	6. Rp.: Sir. Paracetamol 100 ml D. P. Приемать взрослым по 1-2 мерной ложки 3 раза в сутки.
7. Rp.: Caps. Emeprazoli 0,02 D.t.d.N. 10 S. Вводить по 1 капсуле 1 раз в день до еды.	8. Rp.: Tabl. Digoxini 0,25 D.t.d.N. 10 S. По 1 таблетке 2 р/д.
9. Rp.: Sol. Furosemi di 10% - 2ml D.t.d.N. 10 in amp. S. По 2 мл 2 раза в день с 9,9% р-ра изотонического раствора, вводить 6/6 с 9,9% р-ра изотонического раствора 1-2 мл, 1 п/д.	10. Rp.: Sol. Strophantini 0,05 - 1ml D.t.d.N. 10 in amp. S. По 1 мл 6/6 1 п/д, вводить 6/6 100 мл 9% р-ра изотонического раствора.
11. Rp.: Sol. Diclofenaci 2,5% - 3ml D.t.d.N. 15 in amp. S. Вводить по 3 мл 2-3 раза в день, предварительно развести в 9,9% р-ра изотонического раствора.	12. Rp.: Caps. Lanzoprazoli 0,03 D.t.d.N. 20 S. Вводить по 1 капсуле 1 п/д до еды.