

Таблица 1. Использование различных ортопедических конструкций при аплазии эмали.

ГИПОПЛАЗИЯ ЭМАЛИ			ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ (КОНСТРУКЦИИ)
СИСТЕМНАЯ	МЕСТНАЯ	ФОРМА:	
	1) ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА	А) ПЯТНИСТАЯ.	-ЛАМИНИРОВАНИЕ (ЛЮМИНИРЫ) -ВИНИРЫ (*При данной форме патологии лечение используется только при испытании пациентом эстетического дискомфорта)
	2) НЕДОРАЗВИТИЕ ЭМАЛИ	А) ВОЛНИСТАЯ;	-ЛАМИНИРОВАНИЕ (ЛЮМИНИРЫ) -ВИНИРЫ (*При данной форме патологии лечение используется только при испытании пациентом эстетического дискомфорта)
		Б) ТОЧЕЧНАЯ;	-ВИНИРЫ -КОРОНКИ (ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ, ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ, ЦИРКОНИЕВЫЕ)
		В) БОРОЗЧАТАЯ.	-ВИНИРЫ -КОРОНКИ (ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ, ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ, ЦИРКОНИЕВЫЕ)
	3) ОТСУТСТВИЕ ЭМАЛИ(ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ)	ЗУБЫ ГЕТЧИНСОНА, ПФЛЮГЕРА, ФУРНЬЕ	-ВИНИРЫ -КОРОНКИ (ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ, МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ, ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ, ЦИРКОНИЕВЫЕ)