

Ингаляционный способ введения лекарственного средства

При различных
заболеваниях
дыхательных путей и
легких пользуются
введением лекарств
непосредственно в
дыхательные пути

Таким способом вводят
лекарственные вещества
как местного, так и
системного воздействия:


Газообразные вещества

Пары летучих жидкостей

Аэрозолей

Для введения лекарств
применяют дозированные
баллончики, спейсеры,
небулайзеры, паровые ингаляции

Ингаляция
лекарственного
средства через нос
или рот



Выполнил(а): студентка 111
группы
Сестринского дела
Усанова Анастасия Сергеевна

Красноярск 2023

Ингаляционный способ введения лекарственного средства через рот

1. Дать пациенту пустой баллончик.
2. Выполнение процедуры:
снять с ингалятора защитный колпачок;
перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и встряхнуть его;
сделать глубокий выдох через рот;
взять в рот мундштук ингалятора, плотно обхватив его губами. Голову при этом слегка запрокинуть назад;
сделать глубокий вдох через рот и одновременно нажать на дно баллончика;
извлечь мундштук ингалятора изо рта, задержать дыхание на 5-10 сек.
сделать свободный выдох.
3. Попросить пациента провести процедуру сначала с пустым баллончиком, а затем с действующим ингалятором в присутствии медсестры.



Ингаляционный способ введения лекарственного средства через нос

- Дать пациенту пустой баллончик.
2. Выполнение процедуры:
снять с ингалятора защитный колпачок;
перевернуть баллончик с аэрозолем вверх дном и встряхнуть его;
слегка запрокинуть голову, склонить её к правому плечу;
прижать пальцем правое крыло носа к перегородке;
сделать глубокий выдох через рот;

- f. ввести кончик мундштука в левую половину носа;
 - g. сделать глубокий вдох через нос и одновременно нажать на дно баллончика;
 - h. извлечь мундштук из носа, задержать дыхание на 5-10 сек., сделать свободный выдох; при ингаляции в правую половину носа склонить голову к левому плечу и прижать к носовой перегородке левое крыло носа
3. Попросить пациента провести процедуру сначала с пустым баллончиком, а затем с действующим ингалятором в присутствии медсестры.

