

При попадании биологической жидкости пациента на слизистые ротоглотки немедленно рот и горло прополоскать 70% спиртом или 0,05% раствором марганцово-кислотного калия; при попадании биологических жидкостей в глаза промыть их раствором марганцовокислого калия в воде в соотношении 1:10000; - При уколах и порезах вымыть руки, не снимая перчаток, проточной водой с мылом, снять перчатки, выдавить из ранки кровь, вымыть руки с мылом и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода;

При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин заклевать поврежденные места лейкопластырем;

Для ухода за кожей рук использовать смягчающие и защитные кремы, обеспечивающие эластичность и прочность кожи.

2.4. Перед выполнением процедур, а также после выполнения процедур обязательно мыть и дезинфицировать, руки.

3. Требования безопасности для медицинской сестры в аварийных

3.1. В случае возникновения пожара следует:

• немедленно сообщить об этом и пожарную охрану;

принять меры к эвакуации людей; • при необходимости обесточить приборы и оборудование,

приступить к тушению пожара

имеющимися средствами

пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран); принять меры по вызову к месту пожара заведующего отделением.

3.2. При поражении персонала или пациента током: до прекращения воздействия тока запрещается касаться оголенными руками за обнаженные части тела пострадавшего;

срочно освободить пострадавшего путем отключения от сети электроприбора или выключения тока рубильником, в случае невозможности быстрого отключения тока, следует откинуть провод сухим предметом, не проводящим ток (деревянной палкой) или оттащить пострадавшего от токоведущих частей за сухую одежду, действуя только одной рукой; оказать пострадавшему первую помощь при поражении электрическим током; при нарушении дыхания и (или) сердечной деятельности параллельно с оказанием первой помощи срочно вызвать реаниматолога (тел. 32-41). срочно сообщить заведующему отделению или ответственному врачу.

3.3. В случае получения сообщения по телефону о возможном