

Выполнила: ординатор 204 группы специальности 31.08.67 – Хирургия
Назаренко Елена Александровна.

Ответы на контрольный вопрос по теме «Сепсис».

Критерии постановки диагноза « Сепсис».

Инфекция, предполагаемая или подтверждённая в сочетании с несколькими (2 и более) из следующих критериев:

Гипертермия, температура $>38,3^{\circ}\text{C}$

Гипотермия, температура $<36^{\circ}\text{C}$

Частота сердечных сокращений $>90/\text{мин}$ (>2 стандартных отклонений от нормального возрастного диапазона)

Тахипноэ

Нарушение сознания

Необходимость инфузионной поддержки (>20 мл/кг за 24 часа)

Гипергликемия ($>7,7$ ммоль/л) в отсутствие сахарного диабета

Лейкоцитоз $>12 \times 10^9/\text{л}$

Лейкопения $<4 \times 10^9/\text{л}$

Сдвиг в сторону незрелых форм ($>10\%$) при нормальном содержании лейкоцитов

Содержание С реактивного белка в крови >2 стандартных отклонений от нормы

Содержание прокальцитонина в крови >2 стандартных отклонений от нормы

Артериальная гипотензия: АДсиста <90 мм. рт. ст., АДсра <70 мм. рт. ст., или снижение АДсист более, чем на 40 мм. рт. ст. (у взрослых) или снижение АДсист как минимум на 2 стандартных отклонения ниже возрастной нормы.

Сатурация $\text{SVO}_2 >70\%$

Сердечный индекс $>3,5$ л/мин/м

Критерии органной дисфункции:

Артериальная гипоксемия $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 <300$

Острая олигурия $<0,5$ мл/кг $\times$ час

Повышение креатинина более чем на 44 мкмоль/л (0,5 мг%).

Нарушения коагуляции: АПТВb >60 сек. или МНОс $>1,5$.

Тромбоцитопения $<100 \times 10^9/\text{л}$

Гипербилирубинемия >70 ммоль/л

Парез кишечника (отсутствие кишечных шумов)

Показатели тканевой гипоперфузии

Гиперлактатемия >1 ммоль/л

Симптом замедленного заполнения капилляров, мраморность конечностей.