

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра онкологии и лучевой терапии с курсом ПО

Паллиативная медицинская помощь взрослому населению и детям

**Сборник методических указаний для обучающихся к практическим занятиям по направлению
подготовки 34.03.01 Сестринское дело (очная форма обучения)**

Красноярск

2022

Паллиативная медицинская помощь взрослому населению и детям : сборник методических указаний для обучающихся к практическим занятиям по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (очная форма обучения) / сост. . - Красноярск : тип. КрасГМУ, 2022.

Составители:

Сборник методических указаний к практическим занятиям предназначен для аудиторной работы обучающихся. Составлен в соответствии с ФГОС ВО 2017 по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (очная форма обучения), рабочей программой дисциплины (2022 г.) и СТО СМК 8.3.12-21. Выпуск 5.

Рекомендован к изданию по решению ЦКМС (Протокол № 10 от 26 мая 2022 г.)

© ФГБОУ ВО КрасГМУ
им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России, 2022

1. Тема № 5. Нутритивная поддержка онкологических больных.

2. Разновидность занятия: комбинированное

3. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения

4. Значение темы (актуальность изучаемой проблемы): Частота нутритивной недостаточности (НН) среди онкологических больных достигает 40-80%. НН ассоциируется со снижением общей выживаемости, ухудшением непосредственных и отдаленных результатов лечения, ухудшением переносимости проводимой терапии, снижением качества жизни. Своевременная диагностика НН и назначение нутритивной терапии является одним из важных компонентов сопроводительной терапии на всех этапах противоопухолевого лечения. В статье представлены современные методы оценки нутритивного статуса и принципы нутритивной поддержки у онкологических больных, в том числе с использованием готовых гиперкалорических смесей для энтерального питания (сиппинг) как наиболее доступного и физиологичного метода.

5. Цели обучения

- **обучающийся должен знать** медицинские технологии, медицинские изделия, лекарственные препараты дезинфицирующие средства и их комбинации при решении профессиональных задач., морфофункциональные, физиологические и патологические состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях для решения профессиональных задач, основы этики и деонтологии при общении с онкологическими больными и их родственниками., диагностика недостаточности питания у неизлечимых пациентов, **уметь** умение собрать сестринский анамнез (проводить сбор информации о пациенте), осуществлять лекарственную терапию по назначению врача у онкологических больных, использовать знания об основах реабилитации онкологических больных, общаться с инкурабельными пациентами и их родственниками с применением этических норм и деонтологических аспектов, определить имт (индекс массы тела), **владеть** постановкой и уходом за назогастральным зондом., техникой ухода за коло-, чисто-, нефро-, гастро- и трахеостомами., уходом за катетерами (венозными портами), уходом за полостью рта., навыками оценки общего состояния онкологического пациента (шкала есод, индекс карновского)

6. Место проведения и оснащение занятия:

7. Аннотация (краткое содержание темы)

Нутритивная поддержка (nutrition support) проводится с лечебной целью в период повышенной потребности организма в энергетическом и пластическом обеспечении.

Доказанные эффекты нутритивной поддержки:

1. Удовлетворение потребностей организма макронутриентами (белки, жиры, углеводы), микронутриентами (витамины, микроэлементы) и фармаконутриентами (антиоксиданты, глутамин, аргинин, омега-3 жирные кислоты и др.).
2. Восстановление азотистого баланса в организме.
3. Сокращение частоты раневой инфекции и нозокомиальных инфекционных осложнений.
4. Сокращение частоты и тяжести послеоперационных осложнений, включая полиорганическую недостаточность (ПОН).
5. Уменьшение длительности пребывания больного в палате интенсивной терапии, а также длительности ИВЛ и времени госпитализации.
6. Снижение летальности.
7. Повышение качества жизни.
8. Снижение расхода дорогостоящих лекарств и препаратов крови.
9. Профилактика и лечение рак - ассоциированной недостаточности питания.
10. Профилактика и лечение недостаточности питания на фоне химио- и химиолучевой терапии.
11. Возможность проведения полноценной цитотоксической химиотерапии и / или лучевой терапии, а также улучшение их переносимости.

Для диагностики степени недостаточности питания предложено много критериев, из которых наиболее распространенными являются: непроизвольная потеря массы тела; адекватность приема пищи за последний период; индекс массы тела; тяжесть заболевания.

Однако для пациентов, получающих противоопухолевую терапию, учитываются дополнительные факторы: рост, вес и темпы потери массы тела; расположение первичной опухоли и метастазов; общее состояние; наличие отеков; физическая активность; характер проводимого лечения и его осложнения; влияние опухоли на функцию органов пищеварения; режим питания и аппетит; лабораторные показатели.

Скрининг и мониторинг пациентов для назначения нутритивной поддержки:

Своевременное выявление пациентов из группы риска нарушения питательного статуса позволяет защитить больного от прогрессирующей потери массы тела и развития рефрактерной кахексии. Скрининг и мониторинг недостаточности питания должны проводиться на протяжении всего времени лечения онкологического больного. С

этой целью можно использовать:

- 1) опросники, которые наиболее удобны для выявления пациентов с риском развития недостаточности питания (NRS-2002, SGA, ESMO);
- 2) антропометрические и лабораторные показатели для оценки имеющейся недостаточности питания.

Оценка нутритивной недостаточности:

- Индекс нарушения питания по Buzby G. P. (ИНР), который рассчитывается по формуле:

ИНР > 97,5 – нет нутритивной недостаточности.

ИНР от 83,5 до 97,5 – средняя степень недостаточности питания.

ИНР < 83,5 – тяжелая степень недостаточности питания.

- Индекс массы тела по Кетле:

Норма – 21–25 кг / м².

Истощение отчетливое – до 20 кг / м².

Истощение значительное – до 17 кг / м².

Истощение предельное – до 16 кг / м².

Нутритивная поддержка может быть проведена следующими **способами**:

- 1) энтеральное питание;
- 2) парентеральное питание;
- 3) смешанное питание.

Энтеральное питание. Является наиболее предпочтительным способом проведения нутритивной поддержки, поскольку обеспечивает попадание нутриентов в желудочно-кишечный тракт и поддерживает синтез белка, регуляцию обмена веществ в висцеральных органах, а также биохимических процессов, протекающих в стенке кишечника. Энтеральное питание поддерживает всасывательную функцию слизистой оболочки тонкой кишки и участвует в сохранении защитного барьера, отделяющего патогенные микроорганизмы кишечника от системной циркуляции.

Противопоказания к энтеральному питанию:

- непереносимость или анафилаксия на отдельные составляющие питания;
- ишемия кишечника;
- механическая острая кишечная непроходимость;
- острый живот;
- перфорация кишечника;
- сывороточный лактат > 3 ммоль / л (маркер ацидоза);
- гипоксия рO₂ < 50 мм рт. ст.;
- рCO₂ > 80 мм рт.ст., ацидоз – pH < 7,2.

Способы проведения энтерального питания:

- Сиппинг (sip feeding) – пероральный прием питательной смеси через трубочку мелкими глотками, при этом предпочтительно использовать специализированные смеси, содержащие максимальное количество питательных веществ в минимальном объеме.
- Энтеральное зондовое питание (через назогастральный или назоинтестинальный зонд);
- Энтеральное питание через стому (чрескожную эндохирургическую, лапароскопическую, лапаротомную) при длительности более 6 недель.

При отсутствии возможности пациента питаться перорально в достаточном объеме (например, при развитии дисфагии) целесообразно проведение нутритивной поддержки через зонд или гастроэзоностому. Установка назогастрального или назоинтестинального зонда является самой простой и безопасной процедурой, позволяющей

наладить энтеральное питание в необходимом для пациента объеме.

Пути осуществления доступа для энтерального питания

Выбор пути для проведения энтерального питания зависит от того, сможет ли пациент вернуться к пероральному питанию и в какие сроки: назогастральный или назоэнональный зонд (до 6 недель в зависимости от материала, из которого изготовлен зонд); гастро- или юностома, в том числе эндоскопическая (до 1 года).

Показания для наложения стомы:

- невозможность установки назогастрального или назоинтестинального зонда;
- поражение ротовой полости;
- выраженная обструкция пищевода;
- стенозирование просвета желудка;
- поражение слизистых верхних отделов ЖКТ (например, на фоне химиотерапии);
- необходимость длительного (более 6-8 недель) зондового питания.

Противопоказания к энтеральному (оро- / назоинтестинальному) зондовому питанию:

- пищеводные структуры / дивертикулы;
- пищеводная обструкция;
- разрывы стенки пищевода;
- переломы носа.

Противопоказания для установки эндоскопических гастростом

- Абсолютные: перитонит; коагулопатия; нет возможности для диафанскопии; канцероматоз брюшины.
- Относительные: асцит; перитонеальный диализ; язва желудка.

В некоторых ситуациях, например, когда требуется продолжительная подготовка к операции или неoadьювантная терапия, у больных раком пищевода с имеющимися нарушениями прохождения пищи целесообразно рассмотреть вопрос о стентировании, поскольку это позволит восстановить естественное пероральное питание.

Оценка потребностей пациента в нутриентах:

Согласно рекомендациям ESPEN¹, потребности пациентов в энергии составляют:

- 1) для амбулаторных - 30-35 ккал / кг массы тела;
- 2) для стационарных и лежачих - 20-25 ккал / кг массы тела.

Потребности пациентов в белке находятся в диапазоне между 1,2-2 г / кг массы тела.

Парентеральное питание

Под парентеральным питанием (ПП) понимают способ введения необходимых организму нутриентов непосредственно в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт.

Основными составляющими парентерального питания являются:

1. Источники энергии - растворы углеводов и жировые эмульсии.
2. Растворы глюкозы - 10 %, 20 %, 30 %.
3. Жировые эмульсии:
4. жировые эмульсии на основе длинноцепочечных триглицеридов (LCT);
5. жировые эмульсии на основе смеси длинноцепочечных и среднеподцепочечных триглицеридов (MCT / LCT 50:50);
6. жировые эмульсии на основе смеси длинноцепочечных и среднеподцепочечных триглицеридов с добавлением омега-3 жирных кислот (MCT / LCT / омега-3 жирные кислоты);
7. жировые эмульсии на основе только рыбьего жира (омега-3 жирных кислот).
8. Источники пластического материала для синтеза белка - растворы кристаллических аминокислот.
9. Растворы аминокислот общего назначения.
10. Растворы аминокислот специального назначения:
 11. а) дипептиды глутамина;
 12. б) растворы аминокислот для больных с печеночной недостаточностью;
 13. в) растворы аминокислот для больных с почечной недостаточностью;

14. d) растворы аминокислот, предназначенные для детей.

Поливитаминные комплексы для парентерального введения

- Препараты водорастворимых витаминов.
- Препараты жирорастворимых витаминов.
- Препараты водо- и жирорастворимых витаминов.
- Комплексы микроэлементов для парентерального введения

Комбинированные препараты для парентерального питания.

- Комбинированные двухкомпонентные контейнеры «Два в одном» (раствор аминокислот + глюкоза).
- Комбинированные трехкомпонентные препараты «Три в одном» (раствор аминокислот + глюкоза + жировая эмульсия).
- Комбинированные трехкомпонентные препараты «Три в одном» (аминокислоты + глюкоза + многокомпонентная жировая эмульсия с включением омега-3 жирных кислот).

Режимы парентерального питания.

- Круглосуточное введение сред: оптимально для больных в стационаре; наилучшая переносимость и утилизация субстратов;
- Продленная инфузия в течение 18-20 часов: хорошая переносимость; в интервалах рекомендуется введение 5 % глюкозы;
- Циклический режим - инфузия в течение 8-12 часов: удобно при домашнем парентеральном питании; хорошая переносимость после периода адаптации.

Противопоказания к парентеральному питанию:

- анурия или гипергидратация без диализа;
- жировая эмболия (для жировых эмульсий);
- сывороточный лактат > 3 ммоль / л, гипоксия рО2 < 60 мм рт. ст.;
- рСО2 > 80 мм рт. ст., ацидоз - рН < 7,2;
- непереносимость или анафилаксия на отдельные составляющие питания.

Смешанное питание. Энтеральное и парентеральное питание может назначаться пациенту одновременно при недостаточной эффективности одного из этих методов.

Алгоритм назначения нутритивной поддержки

1. Определить показания к назначению нутритивной поддержки (оценка нутритивного статуса).
2. Определить потребности пациента в основных нутриентах (энергия, белок).
3. Выбрать способ проведения нутритивной поддержки (энтеральное / парентеральное / смешанное питание; пероральное, зондовое питание или питание через стому);
4. Выбрать препарат для нутритивной поддержки.
5. Осуществлять мониторинг.

Нутритивная поддержка при проведении химиолечевой терапии:

1. Нутритивная поддержка должна начинаться одновременно с началом лучевой / химиолечевой терапии.
2. Предпочтительный способ проведения нутритивной поддержки - пероральное питание (сиппинг).
3. При невозможности перорального питания (локализация опухоли, осложнения противоопухолевой терапии, например стоматит III-IV степени, невозможность перорального питания в адекватном объеме) целесообразно проводить нутритивную поддержку с использованием назогастрального или назоинтестинального зонда (при предполагаемой длительности питания не более 6 недель).
4. Если предполагается, что в течение 6 недель пациент не сможет вернуться к адекватному пероральному питанию, необходимо рассмотреть вопрос об установке гастро- или юностомы для питания.
5. Выбор препарата для проведения нутритивной поддержки должен отвечать потребностям пациента в белке и энергии. Использование высокобелкового питания для сиппинга является более предпочтительным.
6. У больных в случае развития мукозита на фоне лучевой терапии целесообразно включать питательные смеси, обогащенные омега-3 жирными кислотами и пищевыми волокнами.
7. Мониторинг нутритивного статуса и коррекция нутритивной поддержки должны проводиться на всем протяжении противоопухолевой терапии. У больных в постлучевом периоде необходимо проводить мониторинг питательного статуса до его нормализации и, соответственно, продолжать нутритивную поддержку.

Рекомендации после завершения курса химио- и лучевой терапии:

1. После завершения курса лечения в выписном эпикризе должна быть сделана запись о динамике нутритивного статуса и проводимой нутритивной поддержке.
2. Пациенту должно быть рекомендовано продолжить контроль за массой тела.
3. Решение о продолжении нутритивной поддержки должно приниматься индивидуально с учетом плана лечения.

Нутритивная поддержка у пациентов с опухолями головы и шеи:

На амбулаторном этапе (предоперационный этап):

1. При первичном осмотре пациента проводится оценка нутритивного статуса:
 - изменение веса за последние три месяца (потеря 10 % и более);
 - индекс массы тела (менее 18,5 кг / м²);
 - ухудшение возможности приема пищи за последнюю неделю;
 - объем потребления пищи.
2. При наличии хотя бы одного из указанных факторов необходимо начинать нутритивную поддержку.
3. Предпочтительный способ – пероральное питание (сиппинг). При невозможности или неадекватности перорального питания требуется установка назогастрального зонда или наложение временной гастростомы
4. Нутритивная поддержка должна обеспечивать общий калораж 25-30 ккал / кг / день, адекватную дозу белка – не менее 1-1,5 г / кг / день (в связи с повышенной потребностью в белке онкологического больного), восполнение недостатка витаминов и минералов.
5. Предпочтительно использовать готовые смеси с повышенным содержанием белка.
6. Повторная оценка нутритивного статуса пациента (ре-скрининг) проводится непосредственно перед госпитализацией. Фактическая нормализация всех показателей трофического гомеостаза (общий белок, альбумин, лимфоциты) и динамика веса позволяет выполнить хирургические вмешательства. Если за 10-14 дней не удается нормализовать показатели трофического статуса, целесообразно отложить выполнение операции и продолжить нутритивную коррекцию для снижения риска развития послеоперационных осложнений.

Предоперационный период

У больных, которые могут самостоятельно принимать пищу, предпочтение следует отдавать сиппинговым формам специализированного питания. Необходимым условием для применения данного метода являются отсутствие нарушения сознания, сохранение глотательной функции и желание больного принимать питательные средства. При невозможности приема пищи естественным путем требуется установка назогастрального зонда или наложение временной гастростомы для болюсного введения питательных смесей.

Послеоперационный период

В послеоперационном периоде нутритивная поддержка должна быть продолжена в виде энтерального зондового питания методом сеансового введения через 12 часов после операции (рис. 2). Преимуществом подобного подхода является своевременная стимуляция моторики желудка и кишечника. Жидкие формы питательных смесей удобны в клинической практике, так как не нуждаются в дополнительном разведении и полностью готовы к использованию в течение 24 часов после вскрытия упаковки.

В случае гладкого течения послеоперационного периода и выполнения одномоментной реконструкции органов орофарингеальной зоны зондовое питание может быть прекращено на 14-е сутки.

Рекомендации после выписки из стационара

1. При наличии у пациентов оро- и / или фаринго- и / или эзофаго- и / или гастростом показано проведение зонда для питания через стому в желудок и продолжение нутритивной поддержки после выписки до момента устранения стом с полным восстановлением пищевого рациона.
2. Выбор метода зондового питания и его объема (режим единственного или дополнительного источника) определяется совместно с пациентом.

Нутритивная поддержка у пациентов с опухолями проксимальных отделов ЖКТ (пищевод, желудок):

Предоперационный период

- При наличии показаний нутритивную терапию начинают на поликлиническом этапе после оценки

нутритивного статуса и продолжают в течение всего периода обследования и после поступления в стационар для операции. При сохранении возможности перорального приема пищи применяют готовые сбалансированные смеси для перорального приема (сиппинг) в дозе 400-600 мл (600-900 ккал / сут).

- При невозможности перорального приема пищи (опухоли верхних отделов пищеварительного тракта, стеноз желудка, кишечная непроходимость) проводят зондовое, парентеральное или смешанное питание согласно расчетной суточной потребности. При внутрижелудочном введении смеси, особенно у пациентов с нарушением эвакуации из желудка, перед введением очередной порции следует определять остаточный объем желудочного содержимого и в том случае, если он составляет более половины ранее введенной порции, очередное кормление следует пропустить.
- Длительность предоперационной поддержки должна составлять не менее 7 дней. При тяжелых формах нутритивной недостаточности курс нутритивной терапии может быть увеличен до 10-14 суток и более.
- Использование высокобелкового питания для сиппинга является более предпочтительным. Назначение на предоперационном этапе смесей с иммуноактивными компонентами (аргинин, омега-3-ЖК, РНК) достоверно уменьшает частоту инфекционных осложнений в послеоперационном периоде.
- Отсутствие ограничения питания накануне операции.
- Твердая пища - за 6 часов до операции.
- Светлые прозрачные жидкости за 2 часа до операции безопасны и эффективны.
- Углеводсодержащие жидкости до операции позволяют уменьшить послеоперационный катаболизм, инсулинерезистентность и гипергликемию, мышечную слабость.

Интраоперационный этап

- Обеспечение возможности раннего энтерального питания (установка зонда, гастростомия, еюостомия).
- Использование протоколов ускоренной реабилитации (малоинвазивная хирургия, рациональная инфузионная терапия, регионарная анестезия и т.п.).

Послеоперационный период

- Установлено, что раннее энтеральное питание ассоциировано со снижением числа инфекционных осложнений, продолжительности госпитализации и не влияет на частоту несостоительности швов кишечного анастомоза.
- Раннее энтеральное питание (зондовое или пероральное) по возможности начинают с первых суток послеоперационного периода. Зондовое питание начинают с введения смеси со скоростью 20-30 мл / час, увеличивая скорость по мере переносимости в течение 48-72 часов. При этом максимальный темп подачи смеси не должен превышать 125 мл / час. Более технологичным является аппаратный метод введения питательной смеси с помощью специальных насосов для энтерального питания, позволяющий более точно подбирать скорость введения смеси. При длительном зондовом питании каждые 3-4 часа зонд следует промывать кипяченой водой (30-50 мл) комнатной температуры, а при использовании ниппельных зондов с внутренним диаметром до 3 мм это необходимо делать каждые 2 часа.
- Целесообразно использовать стандартные или высокобелковые смеси.
- Если энтеральное питание покрывает менее 60 % суточной потребности, его комбинируют с парентеральным. На полное парентеральное питание переходят при невозможности или непереносимости энтерального кормления.
- При полном переходе на пероральный прием пищи продолжают нутритивную поддержку готовыми смесями (сиппинг) с повышенным содержанием белка.

Нутритивная терапия на этапах динамического наблюдения

- Оценивают нутритивный статус и степень нутритивной недостаточности при каждом контролльном обследовании (NRI, SGA).
- Назначают нутритивную терапию (сиппинг) в соответствии с энергетическими потребностями и фактически потребляемым объемом и составом пищи.
- Проводят профилактику и лечение функциональных нарушений со стороны органов пищеварения.

Нутритивная поддержка у пациентов с опухолями толстой кишки

Предоперационный период

- Всем пациентам должен проводиться скрининг для выявления риска недостаточности питания. У пациентов с имеющейся недостаточностью питания необходимо проводить оценку ее выраженности.
- Проведение нутриционной поддержки следует начинать, если у пациента имеется недостаточность питания или если ожидается, что пациент не сможет питаться обычным путем более семи суток.
- Также проведение нутриционной поддержки начинают, если ожидается, что прием пищи будет недостаточным (< 60 % от оцениваемого расхода энергии) более десяти суток.

- Нутритивную поддержку необходимо проводить за 10–14 дней перед обширными операциями.
- В тех случаях, когда для проведения нутриционной поддержки по каким-либо причинам невозможно использовать энтеральный путь, ее следует проводить парентеральным путем. Дополнительное ПП должно компенсировать разницу между действительным пероральным / энтеральным поступлением нутриентов и оцениваемыми потребностями в них.
- Нет оснований применять ПП, когда поступление нутриентов пероральным или энтеральным путем достаточное.
- Отсутствие ограничения питания накануне операции.
- Твердая пища – за 6 часов до операции.
- Светлые прозрачные углеводсодержащие жидкости – за 2 часа до операции.

Послеоперационный период

- Раннее назначение энтерального питания. Первый прием жидкости в объеме 300 мл – 10-процентный раствор глюкозы – разрешен через 3 часа после операции.
- Рекомендовано начинать НП в течение первых 24 часов после операции.
- Предпочтительно пероральное питание.
- Целесообразно использовать стандартные или высокобелковые смеси.
- Использование жевательной резинки способствует разрешению пареза.

8. Вопросы по теме занятия

1. Доказанные эффекты нутритивной поддержки
2. Принципы нутритивной поддержки у онкологических больных.
3. Методы оценки нутритивной недостаточности.
4. Энтеральное питание: показания, противопоказания, способы

9. Тестовые задания по теме с эталонами ответов

1. ИНДЕКС НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ ПО BUZBY ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ:
 - 1) более 97,5;
 - 2) 93,5;
 - 3) 90,5;
 - 4) 87,5;
 - 5) менее 83,5;
2. ПОКАЗАНИЯ К ПАРЕНТЕРАЛЬНОМУ ПИТАНИЮ:
 - 1) анурия / гипергидратация без диализа;
 - 2) сывороточный лактат > 3 ммоль / л;
 - 3) гипоксия рO₂ < 60 мм рт. ст.;
 - 4) ацидоз - pH < 7,2;
 - 5) невозможность проведения энтерального питания;
3. ОПРОСНИКИ ДЛЯ СКРИНИНГА НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ:
 - 1) IPSS;
 - 2) MSKCC;
 - 3) NRS-2002;
 - 4) МИЭФ-5;
 - 5) EGOC;
4. СПОСОБ ЭНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ:
 - 1) инфузия через порт;
 - 2) сиппинг;
 - 3) дриппинг;
 - 4) мувинг;
 - 5) миссинг;
5. ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ESPEN:
 - 1) 5-10 ккал / кг массы тела;
 - 2) 15-20 ккал / кг массы тела;
 - 3) 20-25 ккал / кг массы тела;
 - 4) 25-30 ккал / кг массы тела;
 - 5) 30-35 ккал / кг массы тела;

10. Ситуационные задачи по теме с эталонами ответов

1. У больной Р, 70 лет с диагнозом рак молочной железы IV ст., множественными метастазами в легкие и лимфоузлы средостения отмечается прогрессирующее похудание – 10 кг за последние 3 мес, нарастающая слабость. ИМТ – 18,5, общий белок – 58 г/л.

Вопрос 1: Какое состояние развилось у пациентки?;

Вопрос 2: Показатели, говорящие о наличии питательной недостаточности?;

Вопрос 3: Основные принципы нутритивной поддержки?;

Вопрос 4: Наиболее оптимальный способ нутритивной поддержки у данной пациентки?;

Вопрос 5: Какова рекомендуемая суточная потребность в энергии и белке у данной пациентки?;

1) Синдром анорексии-кахексии;

2) Похудение более 5% массы тела, ИМТ менее 19, белок менее 60 г/л;

3) Своевременность, оптимальность, адекватность;

4) Энтеральное питание;

5) Белок 1-1,5 г на кг массы и 25-35 ккал на кг массы тела (при стационарном лечении 35-40 ккал/ кг);

2. Больная К., 36 лет. Жалобы на боли в эпигастральной области, рвоту съеденной пищей, увеличение живота в объеме. Похудела за последние 2 месяца на 15 кг (с 78 кг до 63 кг на момент осмотра), ИМТ= 18кг/м². В биохимическом кровя: альбумины 28 г/л; общий белок 55 г/л. При ЭГДС и рентгеноконтрастном исследовании желудка и пищевода установлено наличие опухоли, инфильтрирующей слизистую желудка по большой и малой кривизне на всем протяжении от кардиального жома до привратника. Выполнена биопсия, гистологическое исследование: умереннодифференцированная аденокарцинома. УЗИ брюшной полости: имеется свободная жидкость в брюшной полости, по брюшине определяются очаги инфильтрации до 1 см в диаметре.

Вопрос 1: Диагноз;

Вопрос 2: Какое состояние развилось у пациентки;

Вопрос 3: Показатели, говорящие о наличии питательной недостаточности;

Вопрос 4: Какова суточная потребность в энергии и белке у данной пациентки в случае стационарного лечения;

Вопрос 5: Рассчитать индекс нарушения питания по BUZBY;

1) Рак желудка 4 ст. Канцероматоз брюшной полости. Асцит;

2) Синдром анорексии-кахексии;

3) Потеря массы тела, ИМТ= 18кг/м². Гипопротеинемия, гипоальбуминемия;

4) 20-25 ккал / кг массы тела;

5) ИНР = $1,519 \times \text{уровень альбумина (г/л)} \times \text{м тела (кг) исходная} / \text{м тела (кг) в наст. момент}$. ИНР= $1,519 \times 28 \times (78/63) = 52,67$ (тяжелая степень недостаточности питания);

3. Пациент Р., 76 лет. Обратился к терапевту по месту жительства с жалобами на прохождение твердой и полужидкой пищи около 2 мес, слабость. Похудел за 2 мес на 10 кг (с 72 кг до 62 кг на момент осмотра). Рост 179 см. При осмотре кожные покровы бледные, чистые, дряблые. АД 110/70 мм рт. ст. Пульс 80 в мин. Дыхание везикулярное, проводится по всем легочным полям. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Симптом 12 ребра отрицателен с обеих сторон. Мочится свободно, моча светлая. Стул 1 раз в 2 дня, оформленный.

Вопрос 1: Степень дисфагии?;

Вопрос 2: Наиболее вероятная причина дисфагии?;

Вопрос 3: Какой синдром осложнил течение заболевания?;

Вопрос 4: Оцените недостаточность питания, какие дополнительные данные необходимы для этого;

Вопрос 5: Наиболее оптимальный способ нутритивной поддержки?;

1) 3 степень (прохождение только жидкой пищи);

2) Опухоль пищевода или кардиального отдела пищевода;

3) Анорексии-кахексии;

4) Индекс массы тела по Кетле $62 / 1,79 \times 1,79 = 19,35 \text{ кг} / \text{м}^2$ (истощение отчетливое - до 20 кг / м²); для расчета ИНР по BUZBY необходимо определение уровня альбумина;

5) Сиппинг после установки пищеводного стента, либо питание через гастростому;

11. Примерная тематика НИРС по теме

12. Рекомендованная литература по теме занятия

- обязательная:

Давыдов, М. И. [Онкология](#) : учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 920 с. - Текст : электронный.

- дополнительная:

[Онкология](#) : учебник / ред. О. О. Янушевич, Л. З. Вельшер, Г. П. Генс [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 592 с. - Текст : электронный.

[Онкология](#) : учебник / ред. Ш. Х. Ганцев, В. Н. Павлов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2020. - 301 с. - Текст : электронный.

Черенков, В. Г. [Онкология](#) : учебник / В. Г. Черенков. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 512 с. - Текст : электронный.

Куртасова, Л. М. [Этот сложный иммунитет против опухолей](#) : учебное пособие / Л. М. Куртасова, Р. А. Зуков, Е. В. Слепов ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2020. - 73 с. - Текст : электронный.

[Паллиативная помощь в амбулаторных условиях](#) : руководство для врачей / ред. О. Ю. Кузнецова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 336 с. - Текст : электронный.

Понкина, А. А. [Правовое регулирование паллиативной медицинской помощи](#) / А. А. Понкина, И. В. Понкин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 176 с. - Текст : электронный.

[Клинические аспекты оказания паллиативной медицинской помощи](#) : учебно-методическое пособие / сост. И. И. Чукаева, Н. В. Орлова, Ф. Д. Ахматова [и др.]. - Москва : РНИМУ, 2020. - 156 с. - Текст : электронный.

- электронные ресурсы:

Портал российского общества клинической онкологии RosOncoWeb (<http://www.rosoncoweb.ru/>)
Рекомендации по поддерживающей и сопроводительной терапии RUSSCO
(<http://www.rosoncoweb.ru/standarts/suptherapy/>)
Российский портал для онкологических пациентов. Психологическая помощь онкобольным и их родственникам.
(<http://www.help-patient.ru/>)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОНКОЛОГИИ (<http://www.oncology.ru/psychological-help/>)