



Симптомы аппендицита



Аппендицит - воспаление червеобразного отростка слепой кишки, одно из самых распространенных хирургических заболеваний. Наиболее часто острый аппендицит встречаются в возрасте от 20 до 40 лет, женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. Летальность составляет 0,1-0,3%, послеоперационные осложнения возникают в 5-9% случаев.

Однако, для постановки этого диагноза хирург проводит настоящее расследование - диагностический поиск! Ведь схоже могут себя проявлять разные заболевания: панкреатит, перфоративная язва желудка/кишки, холецистит, мезентериальный тромбоз, онкология брюшной полости и целый ряд более редких заболеваний.

И в постановке диагноза немаловажную роль во время осмотра играет перкуссия и пальпация. В представленном пособии мы постарались собрать наиболее важные диагностические симптомы, которые студентам обычно трудно запомнить. Они названы по фамилиям хирургов, врачей, которые использовали их в своей практике. Мы собрали их воедино и придумали некоторые мнемонические приемы для запоминания.

Выполнили: Медведева А.Г. , Сысоева А.Ю., 301 леч,
КрасГМУ им. Проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

2020 год

Симптомы Аппендецита

Симптом Кохера-Волковича



Через 2-3 ч от начала заболевания боли, постепенно усиливаясь, перемещаются в правую подвздошную область - зону локализации червеобразного отростка. В дальнейшем после концентрации болей в правой подвздошной области они остаются там постоянно.


Симптом Раздольского



Пальпация



При перкуссии



Глубокая пальпация

В первые часы - однократная рвота рефлекторного характера, влажный, густо обложенный язык. Живот не вздут, равномерно участвует в дыхании. Зона гиперестезии в правой подвздошной области. При глубокой пальпации даже в самые первые часы заболевания - явная, даже довольно значительную болезненность.

Симптом Ровзинга



Левой рукой сквозь брюшную стенку прижимают сигмовидную кишку к крылу левой подвздошной кости, перекрывая её просвет. Правой рукой выше этой зоны производят толчкообразные движения передней брюшной стенки. При этом возникает боль в правой подвздошной области, что связывают с перемещением газов, находящихся в толстой кишке.

Симптом Ситковского



Появление/усиление болей в правой подвздошной области при положении больного на левом боку.

Симптом Бартомье-Михельсона



Болезненность при пальпации слепой кишки, усиливающаяся при положении на левом боку.

Мнемонические правила


Симптом Кохера-Волковича

Как выглядит зажим КОХЕРА? Правильно, он зубчатый и точно так же своей пастью при укусе хватает ВОЛК. Так же и боль, при симптоме КОХЕРА-ВОЛКОВИЧА разивается по животу и концентрируется у червеобразного отростка.




Симптом Раздольского

Симптом Раздольского. РРР. Рефлекторная Рвота и Раздолье для боли.



Пальпация



Глубокая пальпация



При перкуссии


Симптом Ровзинга

Пишется как Rovsing. Поделим слово на две части Rov sing. Сделаем левой рукой "Rov - ров" и посмотрим, запоет ли от боли пациент (по-английски sing-петь).




Симптом Ситковского

СИТуация левый бок.




Симптом Бартомье-Михельсона

Для аналогии представим себе пьяного человека. Вместо того, чтобы корчиться от боли на левом боку у вас на кушетке....пациент бы с удовольствием празднично проводил время в БАРе за СТОЛОМ и с другом МИХаилом ЕЛ, а потом дома видел бы прекрасный СОН.



Симптом Щёткина-Блюмберга



Поверхностная пальпация, кроме гиперестезии, определяют *защитное напряжение мышц брюшной стенки*. При быстром отдёргивании руки после мягкого надавливания на брюшную стенку - внезапное усиление боли вследствие сотрясения брюшной стенки в области воспалительного очага.

Симптом Воскресенского (симптом «рубашки», или «скольжения»)



Через рубашку быстрое скользящее движение рукой вдоль передней брюшной стенки от реберной дуги до паховой связки справа и слева от пупка. При этом отмечают значительное усиление болезненности в правой подвздошной области.

Симптом Образцова



Исследующий правой кистью придавливает брюшную стенку в правой подвздошной области; осторожное поднятие выпрямленной правой нижней конечности вызывает ощущение боли или усиление боли в правой подвздошной ямке.

Симптом Коупа



Больного укладывают на спину и производят ротационные движения правой нижней конечностью, согнутой в коленном и тазобедренном суставах. При наличии воспалительного процесса и тазовом расположении отростка появляется боль в правой подвздошной области.

Симптом Щёткина-Блюмберга

Двойные фамилии всегда трудно запомнить. Но...попробуйте представить. Вы лежите на спине и вам ЩЕТкой проходятся круговыми движениями по животу - он сразу весь напрягается.

БЛЮМ - это фамилия немецкого происхождения, переводится как ЦВЕТОК. То есть, при этом симптоме боль "расЦВЕТает".

БЛЮМ - звук капающей воды. Руками вы делаете движения, как буд-то капает вода. Капля упала и почти что отскочила.

Симптом Воскресенского (симптом «рубашки», или «скольжения»)

Симптом Воскресенского (рубашки) - единственный симптом при котором на теле человека при осмотре что-то надето (рубашка, майка, футболка). Раньше на Руси в ВОСКРЕСЕНЬЕ для похода в церковь надевали чистую рубашку.



Симптом Образцова

Делаем все по ОБРАЗцУ - ОБе Руки НА живот, 3-тья конечность - поднимаем ногУ.



Симптом Коупа

Фамилия Коуп по-английски пишется, как "COPE", похоже на английский "СОРИ". Проводим аналогию: "Сори, сейчас не совсем в привычном положении будет ваша нога, возможно, ее ротация доставит боль".

