

Профилактика

Неспецифическая

✓ *Предотвращение передачи вируса от человека к человеку.*

Необходимо избегать контакта с зараженными людьми.

Это необходимо делать на протяжении 14 дней после предполагаемого момента заражения, в момент развития первых симптомов и в течении 4 дней после появления сыпи на коже.

- Если контакта с пациентом избежать не удастся, то необходимо использовать **СИЗ**: медицинская маска, одноразовые очки, перчатки.
- **Нельзя** пользоваться одной с больным посудой и средствами личной гигиены.

✓ *Укрепление защитных сил организма.*

- Дети дошкольного возраста должны получать достаточное количество витаминов и белка в пище, избегать переохлаждений, частых сезонных простуд и гриппа.

✓ *Изоляция больных* от начала продромальных проявлений до 5 дня с момента появления сыпи, возможно до 10 дня при наличии осложнений со стороны дыхательных путей. Контактные лица изолируются до 21 дня.

НЕ «КОРИТЕ» СЕБЯ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ!

Во избежание неприятностей со здоровьем, лучше быть вовремя информированным, чем заболевшим человеком.

И ПОМНИТЕ!

Родители, которые отказываются от проведения прививок против Кори и других плановых прививок, подвергают риску здоровье и жизнь своих детей.


Иммунизация необходима каждому человеку! Защищая себя и своих детей от этой инфекции, Вы обеспечиваете и безопасность окружающих вас людей.



Выполнила: Усова В.С. 308-1

Определение

Корь



– острое

инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори.

Путь передачи

Воздушно-капельный

(Вирус выделяется при чихании, кашле, дыхании, разговоре)



Источник – человек, больной корью



Вирус кори способен распространяться на большие расстояния с потоком воздуха, особенно в холодное время года!

Симптомы

Инкубационный период составляет в среднем 9 дней.

Заболевание начинается остро с симптомов *общей интоксикации*:




Температура
38-40 градусов



Резкая
слабость



Отсутствие
аппетита




Сухой кашель,
насморк



Конъюнктивит

Через 2-4 дня после первых симптомов болезни на слизистой оболочке щёк - возникают мелкие беловатые высыпания



На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен за ушами и на лбу, на лице, шее, теле и конечностях



Профилактика

Специфическая

Вакцинация против кори проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства:

- ✓ детям: в 1 год и в 6 лет
- ✓ взрослым: с 18 до 35 лет.

Не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим корью - прививка ставится двукратно по **схеме 0-3 месяца**.

Привитые ранее однократно, подлежат проведению **однократной иммунизации**.



По **эпидемическим показаниям** вакцинация необходима всем контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной коревой прививке или перенесенной в прошлом кори.

Вакцины против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся **более 20 лет!**