

память» эмпирическое значение  $U_{\text{эмп}}(9.5)$  находится в зоне значимости; по шкале «Мышление» уровень значимости равен – 0,005; по шкале «Внимание»: методика «Шульте» уровень значимости равен – 0,000; методика «Отсчитывание по Крепелину» уровень значимости равен – 0,005. По опроснику «Стиль саморегуляции поведения»  $U_{\text{эмп}}(6)$  находится в зоне значимости, что говорит о существенных статистических различиях между выборками. Данный факт подтверждает эффективность проводимых нами профилактических и коррекционно-развивающих мероприятий.

Таким образом, проведена психологическая диагностика пациентов с ПТСР, разработана программа тренингов и выявлена их эффективность для пациентов с ПТСР.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров, Е.О. Этапы клинической динамики посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий / Е.О. Александров, Г. Т. Красильников // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2000.
2. Литвинцев, С.В. Боевая психическая травма / С.В. Литвинцев, Е.В. Снедков, А.М. Резник. - Москва, 2005. – 432 с.
3. Зубова, Е.А. К вопросу о посттравматических стрессовых расстройствах (обзор) / Е.А. Зубова // Российский психиатрический журнал. - 1998. - № 1. - С.54-60.
4. Тарабрина, Н.В. Теоретико-эмпирическое исследование посттравматического стресса / Н.В. Тарабрина // Психологический журнал. - 2007. - Т.28, №4. - С.5-12.
5. патопсихологический словарь терминов.  
URL [http://www.psychologist.ru/dictionary\\_of\\_terms/index.htm](http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm)
6. психологический словарь. – URL <http://enc-dic.com/psychiatry/Sindrom->