

Перед прививкой ребенка нужно оберегать от контактов с больными. При наличии пищевой аллергии необходимо строго соблюдать диету, не вводить в рацион новые продукты. Такой же тактики нужно придерживаться в течение 5 – 7 дней после прививки.

В день проведения прививки сокращаются прогулки на улице, ограничиваются контакты с другими детьми, рекомендуется не купать ребёнка в течение суток.

После прививки ребёнок нуждается во внимательном отношении к нему со стороны родителей и наблюдении медперсонала поликлиники в установленные сроки. Для обеспечения медицинского наблюдения за ребёнком в случае возникновения немедленной реакции непосредственно после проведения прививки, родителям следует находиться с ребёнком возле прививочного кабинета в течение 30 минут.

Каждый человек имеет право сделать свой выбор – прививаться или нет, но родители должны знать, что отказываясь от прививок, они лишают своих детей права на здоровье. Кроме того, если в детском учреждении карантин по какой – то инфекции, а у вашего ребёнка отсутствует прививка, то его могут не принять в детский коллектив.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого” Министерства здравоохранения Российской Федерации

Фармацевтический колледж

ПРИКАЗ от 6 декабря 2021 г. N 1122н ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПРИВИВОК, КАЛЕНДАРЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО
ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ И
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Национальный календарь профилактических прививок



НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Возраст детей	Вакцина
Первые сутки после рождения	Всероссийский гепатит В - перенос
3-7 день жизни	БЦЖ (туберкулез)
Первый месяц	Всероссийский гепатит В - перенос
Второй месяц	Всероссийский гепатит В - третий раз для детей из группы риска Пневмококковая инфекция - перенос
Третий месяц	Коклюш, столбняк, дифтерия и полиомиелит (инактивированная вакцина) - перенос
Четвертый и пятый месяцы	Коклюш, столбняк, дифтерия и полиомиелит (инактивированная вакцина) - перенос Пневмококковая инфекция - перенос
Шестой месяц	Коклюш, столбняк, дифтерия и полиомиелит (живая вакцина) - третий раз Всероссийский гепатит В - третий раз
Десятилетний возраст	Эпидемический паротит (свинка), корь, краснуха - перенос

Дети, которым была проведена вакцинация до 1 года, далее проходят только повторные процедуры:

Возраст	Вакцина
15 месяцев	Пневмококковая инфекция - ревакцинация
1,5 года	Коклюш, столбняк, дифтерия (АКДС) и полиомиелит - ревакцинация I
20 месяцев	Полиомиелит - ревакцинация II

Дети, которым была проведена вакцинация до 1 года, далее проходят только повторные процедуры:

Возраст	Вакцина
6 лет	Эпидемический паротит (свинка), корь, краснуха - ревакцинация
6-7 лет	Столбняк, дифтерия - ревакцинация II БЦЖ - ревакцинация I
13 лет	Вирусный гепатит В, краснуха
14 лет	Столбняк, дифтерия - ревакцинация III Полиомиелит (живой препарат) - ревакцинация III

Описание схемы вакцинации

○ Вирусный гепатит В

Болезнь поражает печень, дает осложнения в виде цирроза. Препарат против нее включает белки вируса гепатита В. Процедуры, проводимые в первый год жизни, защищают организм от заболевания до 8 лет. Для детей, которые относятся к группе риска по данной болезни (матери являются носителями вируса или болеют гепатитом В), предусмотрен ускоренный график вакцинации, предполагающий проведение четвертой процедуры. Возможные реакции: повышение температуры тела до 37,5°C, покраснение в зоне укола.

○ БЦЖ-М (туберкулез)

Болезнь поражает легкие и дает осложнения на мозг и кости. Препарат для защиты от нее содержит бактерии бычьего туберкулеза (ослабленные, которые не вызывают заболевания у людей). Однократная процедура защищает до 7 лет. При ослабленном иммунитете (по реакции Манту) включают повторную вакцинацию в график после года. Отсроченная реакция может проявляться в виде уплотнения в месте укола, на месте которого остается небольшой шрам.

○ АКДС (столбняк, коклюш, дифтерия)

Заболевания, по которым регистрируется очень высокая смертность среди новорожденных, опасны выработанными возбудителями токсинами. Комплексный препарат содержит малую концентрацию токсинов столбняка и дифтерии, а также неактивную палочку коклюша. После укола возможно локальное покраснение и уплотнение кожи, а также повышение температуры тела до 38°C, сонливость либо малоподвижность, недомогание.

○ Полиомиелит

Поражает ЦНС, ЖКТ, эндокринную систему, характеризуется высокой смертностью, может приводить к параличу. Инактивированные препараты против заболевания содержат только белки вирусов, «сжиженные» – ослабленный вирус. Иммунитет вырабатывается до 10 лет. В месте укола возможно покраснение и уплотнение. Если препарат дается **перорально**, то реакции почти не бывает, за исключением аллергии в виде кожной сыпи.

○ Краснуха, корь, эпидемический паротит («свинка»)

Болезни опасны осложнениями и тяжелым течением. Профилактические препараты против них содержат ослабленные возбудители (вирусы), вызывающие 100% иммунный ответ, но не приводящие к заражению других людей. Иммунитет вырабатывается до 5 лет. После процедуры возможны: повышение температуры тела, увеличение **лимфоузлов**, покраснение щек и глаз, заложенность носа.

○ Пневмококковая инфекция

Представляет собой комплекс болезней, которые провоцируются бактерией *Streptococcus pneumoniae*. К ним относятся острый средний отит, пневмококковая пневмония, гнойный пневмококковый менингит, артриты, эндокардиты, плевриты. Обычно эта инфекция выступает как осложнение других. Ранее детей прививали от перечисленных болезней на платной основе.

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

Назначение	Сроки вакцинации	Сроки ревакцинации
Против чумы	С 2 лет	Через 1 год
Против туляремии	С 7 лет	Каждые 5 лет
Против бруцеллеза	С 18 лет (профессиональным контингентам)	Через 1 год
Против сибирской язвы	Только профессиональным контингентам	Через 1 год
Против лептоспироза	С 7 лет	Через 1 год
Против лихорадки Ку	С 14 лет	Через 1 год
Против клещевого энцефалита	С 1 года	Через 1 год, далее каждые 3 года
Против брюшного тифа	С 3 лет	Через 1 год
Против гриппа	С 6 месяцев	Ежегодно
Против желтой лихорадки	С 9 месяцев	Через 10 лет
Против бешенства	С 16 лет	Через 1 год, далее каждые 3 года
Против менингококковой инфекции	С 1 года	Через 3 года
Против вирусного гепатита А	С 1 года	Через 6 месяцев Однократно
Против холеры	С 2 лет	Через 6 месяцев

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Вакцины	Противопоказания
Все вакцины	Сильная реакция или осложнения на предыдущую дозу**
Все живые вакцины	Иммунодефицитное состояние (первичное), иммуносупрессия, злокачественные новообразования, беременность
БЦЖ-вакцина	Вес ребенка менее 2000 г, календарный рубец после предыдущей дозы
Вакцина против гепатита В	Аллергическая реакция на пекарские дрожжи
АКДС	Прогрессирующие заболевания нервной системы, фебрильные судороги в анамнезе
АДС, АДС-м	Абсолютных противопоказаний нет
ЖКВ, ЖТВ, краснушная или тривакцина	Тяжелые реакции на аминогликозиды, анафилактические реакции на яичный белок