

Результат тестирования

Бабаян

Процент верных ответов 73
 Время, фактически затраченное на тест 19:36
 Оценка за тестирование 5

[К списку вопросов](#)

Список вопросов

(условные обозначения:  - верный ответ на вопрос,  - неверный ответ на вопрос, ☐ - ответ на вопрос не получен)

Номер	Ответ	Вопрос
1		Для хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита симметричное поражение обеих слюнных желёз является признаком
2		Наилучший эффект обезболивания при удалении постоянных моляров нижней челюсти у детей достигается анестезией
3		Глубина поражения твёрдых тканей зубов при III степени повышенного стирания составляет _____ длины коронки зуба
4		Фиксирующими элементами в аппарате Клармта являются
5		Непосредственно после извлечения зуба из альвеолы необходимо
6		К дополнительным предметам гигиены относятся зубные
7		В диспансер соответствующего профиля извещение о важнейшем неэпидемическом заболевании направляется в течение
8		Показатель индекса РМА в норме равен
9		Для профилактики асфиксии язык прошивается в направлении
10		К первому классу дефектов зубных рядов, по классификации Кеннеди относится дефект
11		Симметричность поражения зубов одного срока минерализации характерна для
12		Корни постоянных резцов и первых моляров заканчивают своё формирование к (лет)
13		При проведении остеотомии нижней челюсти применяется
14		Для детей школьного возраста рекомендуется чистка зубов по методу
15		Экспертиза нетрудоспособности представляет собой вид медицинской деятельности, целью которой является
16		Болезненность при препарировании среднего кариеса
17		Основным методом лечения зубов при несовершенном дентиногенезе является
18		Постоянная гипосаливация наблюдается при
19		Гипертрофия небных миндалин и аденоиды нижних носовых раковин приводят к формированию
20		По МКБ-10 диагнозу «хронический гингивит» соответствует код
21		Гипоплазия эмали молочных зубов обусловлена
22		Наиболее частой причиной образования диастемы является
23		Вредная привычка сосания пустышки приводит к
24		К хирургическим методам лечения пародонтального кармана относят
25		Для ручного удаления поддесневого зубного камня используют инструмент
26		Препарирование кариозной полости I класса предполагает