

ФГБОУ ВО КРАСГМУ ИМ. ПРОФ. В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО МИНЗДРАВА РОССИИ

Кафедра фармакологии и фармацевтического консультирования с курсом ПО

**Веселова О.Ф., Гацких И.В., Вставская Ю.А.,
Бочанова Е.Н., Окладникова Е.В., Потупчик Т.В.**

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

(сборник рецептов для ординаторов)

Методические рекомендации

**Красноярск
2019**

№	Рецепты	
1	Rp.: Amoxicillini 0,875 Ac. clavulanici 0,125 D.t.d. N.14 in tabl. S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	
2	Rp.: Tabl. Amoxicillini 0,5 N.20 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. Rp.: Amoxicillini 0,5 D.t.d. N.16 in caps. S. Внутрь по 1 капсуле 3 раза в день. Rp.: Amoxicillini 0,5 D.t.d. N.14 S. Содержимое 1 пакета всыпать в мерный стакан, развести 10 мл питьевой водой, принимать приготовленную суспензию внутрь. По 1 пакету 3 раза в день.	
3	Rp.: Ceftriaxoni 1,0 D.t.d.N.5 S. Внутривенно по 1,0 1 раз в сутки, развести в 100 мл изотонического раствора хлорида натрия.	
4	Rp.:Tabl. Azithromycini 0,5 N.3 D.S. Внутрь по 1 таблетке за час до еды 1 раз в день.	
5	Rp.:Tabl. Clarithromycini 0,5 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день.	
6	Rp.:Tabl. Ciprofloxacini 0,5 N.10 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день. Rp.: Ung. ophthalmici Ciprofloxacini 3% - 5,0 D.S. Закладывать за нижнее веко 3 раза в сутки. Rp.: Sol. Ciprofloxacini 0,3%- 5ml D.S. Глазные капли. Закапывать по 1-2 капли в конъюнктивный мешок 6 раз в день в оба глаза. Rp.: Sol. Ciprofloxacini 0,2%- 100ml D.t.d.N.10 S. Внутривенно по 200мл (2 флакона) 2 раза в день.	
7	Rp.:Tabl. Levofloxacini 0,5 N.5 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в день.	
8	Rp.:Tabl. Metronidasoli 0,5 N.20 D.S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день после еды.	

	<p>Rp.: Gel Metronidasoli 0,1% - 30,0 D.S. Наносить на пораженные участки кожи 2 раза в сутки.</p>	
9	<p>Rp.:Tabl. Isoniazidi 0,3 N.60 D.S. Внутрь по 1 таблетке после еды 2 раза в сутки.</p> <p>Rp.: Sol. Isoniazidi 10%- 5ml D.t.d.N.10 in amp. S. Вводить внутримышечно по 3 мл 1 раз в день.</p>	
10	<p>Rp.: Rifampicini 0,3 Isoniazidi 0,15 D.t.d. N.100 in tabl. S. Внутрь по 2 таблетке за 1 час до еды 1 раз в день.</p> <p>Rp.: Isoniazidi 0,3 Aethambutoli 0,8 D.t.d. N.100 in tabl. S. Внутрь по 2 таблетке после еды 1 раз в день</p>	
11	<p>Rp.:Tabl. Acycloviri 0,2 N.30 D.S. Внутрь по 1 таблетке 5 раз в сутки.</p> <p>Rp.: Crem Acycloviri 5% - 10,0 D.S. Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 5 раз в день в сутки.</p> <p>Rp.: Ung. Acycloviri 5% - 10,0 D.S. Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 5 раз в день в сутки.</p> <p>Rp.: Ung. ophthalmici Acycloviri 3% - 5,0 D.S. Закладывать за нижнее веко 5 раз в сутки.</p>	
12	<p>Rp.: Oseltamiviri 0,75 D.t.d. N.10 in caps. S. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день.</p>	
13	<p>Rp.: Fluconazoli 0,15 D.t.d. N.1 in caps. S. Внутрь по 1 капсуле однократно</p>	
14	<p>Rp.: Aer. Salbutamoli 200 d.(1d.- 100 mkg) D.S. При приступе удушья 1-2 вдоха.</p> <p>Rp.: Aer. Budesonidi 200 d.(1d.- 200 mkg) D.S. Вдыхать по 1 дозе 1 раз в сутки</p> <p>Rp.: Budesonidi 160 mkg Formoteroli 4.5 mkg D.t.d. N.120 in aer. S. Вдыхать по 1 дозе 2 раза в день.</p>	
15	<p>Rp.: Crem Mometasoni 0,1% - 15,0 D.S. Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в день в сутки.</p> <p>Rp.: Ung. Mometasoni 0,1% - 15,0</p>	

	<p>D.S. Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в день</p> <p>Rp.: Sol. Mometasoni 0,1% - 20 ml</p> <p>D.S. Наносить небольшое количество раствора на пораженные участки кожи 1 раз в день</p>	
16	<p>Rp.: Ung. ophthalmici Hydrocortisoni 0,5% - 5,0</p> <p>D.S. Закладывать за нижнее веко 3 раза в день</p>	
17	<p>Rp.: Sol. Timololi 0,5% - 5ml</p> <p>D.S. Глазные капли. Закапывать по 1 капле в пораженный глаз 2 раза в сутки.</p>	
18	<p>Rp.: Sol. Tropicamidi 0,5% - 5ml</p> <p>D.S. Глазные капли. Закапывать по 1 капле за 15-20 минут до осмотра</p>	
19	<p>Rp.: Sol. Оxybuprocaini 0,4% - 5ml</p> <p>D.S. Глазные капли. Закапывать по 1 капле в глаз, требующего анестезии 3 раза в течение 5 мин.</p>	
20	<p>Rp.: Sir. Loratadini 0,1% - 100ml</p> <p>D.S. Внутрь по 10 мл 1 раз в сутки</p>	
21	<p>Rp.: Ung. Diclofenaci 1%-30,0</p> <p>D.S. Наносить на область правого коленного сустава 3 раза в сутки</p> <p>Rp.: Crem Diclofenaci 2%-30,0</p> <p>D.S. Наносить на поясничную область 3 раза в сутки</p> <p>Rp.: Gel Diclofenaci 1%-50,0</p> <p>D.S. Наносить на пораженную область 3 раза в сутки</p>	
22	<p>Rp.: Gel Ibuprofeni 5%-100,0</p> <p>D.S. Наносить на пораженную область 3 раза в сутки</p> <p>Rp.: Crem Ibuprofeni 5%-50,0</p> <p>D.S. Наносить на пораженную область 3 раза в сутки</p> <p>Rp.: Ung. Ibuprofeni 5%-25,0</p> <p>D.S. Наносить на пораженную область 3 раза в сутки</p> <p>Rp.: Ibuprofeni 0,2</p> <p>D.t.d.N.20 in caps.</p> <p>S. Внутрь по 1 капсуле 3 раза в сутки</p>	
23	<p>Rp.: Ketoprofeni 0,05</p> <p>D.t.d.N.20 in caps.</p> <p>S. Внутрь по 1 капсуле 3 раза в сутки во время еды или сразу после приема пищи</p>	
24	<p>Rp.: Sol. Trimeperidini 1% - 1ml</p>	

	<p>D.t.d.N.10 in amp. S. Внутримышечно по 1 мл каждые 8 часов</p>	
25	<p>Rp.: Morphini 0,03 D.t.d.N.20 in caps. S. Внутрь по 1 капсуле каждые 12 часов, до или после еды</p> <p>Rp.: Morphini 0,06 D.t.d.N.20 in tabl. prolong. obd. S. Внутрь по 1 таблетке каждые 12 часов, не разжевывая, не разламывая и не измельчая</p> <p>ИЛИ</p> <p>Rp.: Sol. Morphini 1% - 1ml D.t.d.N.10 in amp. S. Внутримышечно по 1 мл каждые 8 часов</p>	
26	<p>Rp.: Sol. Colecalciferoli oleosae 0,05% - 10ml D.S. Внутрь по 4 капли 1 раз в сутки</p>	
27	<p>Rp.: Sir. Ac. valproici 5,764% - 150ml D.S. Внутрь по 20 мл 1 раз в сутки</p> <p>Rp.: Ac. valproici 0,3 D.t.d. N.10 in caps. S. Внутрь по 1 капсуле 1 раз в сутки.</p> <p>Rp.: Tabl. Ac. valproici 0,3 N.50 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.</p> <p>Rp.: Sol. Ac. valproici 10%- 5ml D.t.d.N.5 in amp. S. Вводить в вену медленно по 5 мл.</p>	
28	<p>Rp.: Dragee Chlorpromazini 0,05 N.50 D.S. Внутрь по 1 драже 4 раза в сутки.</p> <p>Rp.: Tabl. Chlorpromazini 0,05 N.50 D.S. Внутрь по 1 таблетке 4 раза в сутки.</p> <p>Rp.: Sol. Chlorpromazini 2,5%- 5ml D.t.d.N.10 in amp. S. Вводить глубоко в мышцу по 5 мл.</p>	
29	<p>Rp.: Tabl. Olanzapini 0,01 N.50 D.S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.</p>	
30	<p>Rp.: Tabl. Diazepam 0,005 N.10 D.S. Внутрь по 1/2 таблетке 2 раза в сутки.</p> <p>Rp.: Sol. Diazepam 0,5%- 2ml D.t.d.N.10 in amp.</p>	

	S. Вводить в мышцу 2 мл.	
31	Rp.: Tabl. Enalaprilii 0,01 N.14 D.S. По 1 таб. 2 раза в день внутрь	
32	Rp.: Tabl. Bisoprololi 0,0025 N.60 D.S. Внутрь по 1 таб. 1 раз в день (утром)	
33	Rp.: Amlodipini 0,005 Perindoprilii 0,004 D.t.d. N.14 in tabl. S. Внутрь по 1 таблетке 1 раза в сутки.	
34	Rp.: Tabl. Furosemidi 0,04 N.50 D.S. По 1 таб. утром натощак. Rp.: Sol. Furosemidi 1% - 1 ml D. t. d. N. 10 in amp. S. По 2 мл в вену струйно на физ. растворе.	
35	Rp.: Sol. Heparini 5 ml D. t. d. N. 10 in amp. S. По 0,2 мл (1000 МЕ)/час внутривенно.	
36	Rp.: Tabl. Amlodipini 0,005 N.30 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	
37	Rp.: Tabl. Losartani 0,05 N.20 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	
38	Rp.: Tabl. Atorvastatini 0,01 N.30 D.S. По 1 таблетке 1 раз в день.	
39	Rp.: Sol. Insulini aspartii 3 ml (1ml-100МЕ) D.t.d.N. 5 S. Вводить по 4 ЕД подкожно после еды.	
40	Rp.: Susp. Insulini lisprii 3 ml (1ml-100МЕ) D.t.d.N. 5 S. Вводить подкожно по 40МЕ Rp.: Sol. Insulini lisprii 3 ml (1ml -200 МЕ) D.t.d.N. 5 S. Вводить подкожно по 60 МЕ	
41	Rp.: Insulin glarginii 3 ml (1ml-100 МЕ) D.t.d.N. 5 S. Вводить подкожно в 22 часа по 20 МЕ.	
42	Rp: Tabl. Metformini 0,5 N.100 D.S. Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день (во время или после еды)	
43	Rp.: Sir. Lactulosi 66.7%-500 ml D.S. Внутрь по 3 дозированных ложек (30мл) 3 раза в день	
44	Rp.: Omeprazoli 0,02 D.t.d.N. 20 in caps. D.S. Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день до еды.	
45	Rp.: Sol. Procaini 0,25% - 200 ml D.t.d. N. 5 S. Для инфильтрационной анестезии.	
46	Rp.: Sol. Lidocaini 1% - 2ml D. t. d. N. 5 in amp.	

	S. Для проводниковой анестезии.	
47	Rp.: Sol. Вupivacaini 0,5% - 4 ml D.t.d. N. 5 in amp. S. Для проводниковой анестезии.	
48	Rp.: Tabl. Ac. folici 0,005 N.30 D. S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.	
49	Rp.: Sol. Enoxaparinu natrii 0.4ml (1 ml - 10000ED) D.t.d. N.5 S. Подкожно по 0.4 мл 1 раз сутки	
50	Rp.: Tabl. Warfarini 0,0025 N.30 D. S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.	
51	Rp.: Tabl. Clopidogreli 0,075 N.30 D. S. Внутрь по 1 таблетке 1 раз в сутки.	
52	Rp.: Sol. Drotaverini 2% - 2ml D. t. d. N. 10 in amp. S. Вводить в мышцу по 2 мл 2 раза в день.	
53	Rp.: Tabl. Metoclopramidi 0,01 N.10 D. S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды.	
54	Rp.: Sir. Ferri (III) hydroxydi polymaltosati 1% - 150 ml D.S. Внутрь по 1 дозированной ложке (10мл) 1 раз в день Rp.: Sol. Ferri (III) hydroxydi polymaltosati 1% - 150 ml D.S. Внутрь по 1 дозированной ложке (10мл) 1 раз в день	
55	Rp.: Sir. Carbamazepini 2% - 100 ml D.S. Внутрь по 1 дозированной ложке (5 мл) 2 раза в сутки Rp.: Tabl. Carbamazepini 0,2 N.30 D. S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день.	
56	Rp.: Tabl. Amitriptylini 0,025 N.50 D. S. Внутрь по 2 таблетки за 2 часа до сна.	