

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Красноярский государственный медицинский
университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Фармацевтический колледж

ДНЕВНИК

производственной практики

Наименование практики МДК 01.01 Лекарствоведение

Ф.И.О Каверзиной Анастасии Дмитриевны

Место прохождения практики АО «Губернские аптеки» ЦРА №3

Аптека №130, г. Красноярск, пр. Мира, 132

(фармацевтическая организация)

с « 16 » марта 20 20 г. по « 28 » марта 20 20 г.

Руководители практики:

Общий – Кожукарь Наталья Владимировна (заведующая аптекой)

Непосредственный – Кожукарь Наталья Владимировна (заведующая аптекой)

Методический – Медведева Ольга Александровна (преподаватель)

Красноярск
2020




График прохождения практики

№ п/п	Дата	Часы работы	Наименование работы	Оценка и подпись руководителя практики
1	16.03.20	08:00-14:00	Изучение средств, влияющих на периферическую нервную систему.	отлично
2	17.03.20	08:00-14:00	Изучение средств, влияющих на центральную нервную систему.	отлично
3	18.03.20	08:00-14:00	Изучение средств, влияющих на функции сердечно-сосудистой системы.	отлично
4	19.03.20	08:00-14:00	Изучение средств, влияющих на функции органов дыхания.	отлично
5	20.03.20	08:00-14:00	Изучение средств, влияющих на функции органов пищеварения.	отлично
6	21.03.20	08:00-14:00	Изучение средств, влияющих на функции органов пищеварения	отлично
7	23.03.20	08:00-14:00	Изучение средств, влияющих на систему крови.	отлично
8	24.03.20	08:00-14:00	Изучение антиагрегантов.	отлично
9	25.03.20	08:00-14:00	Изучение гормональных препаратов.	отлично
10	26.03.20	08:00-14:00	Изучение средств для лечения сахарного диабета I и II типов.	отлично
11	27.03.20	08:00-14:00	Изучение противомикробных средств.	отлично
12	28.03.20	08:00-14:00	Изучение противопаразитарных средств.	отлично



Раздел практики: Средства, влияющие на периферическую нервную систему.**Тема: М-холиноблокаторы.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Атропин, глазные капли 1%
МНН	Атропин
Синонимическая замена (ТН)	Атропина сульфат
Аналоговая замена (ТН)	Цикломед, Тропикамид
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Блокирует м-холинорецепторы.
Основные фармакологические эффекты	Расширяет зрачок, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации.
Показания к применению	Исследование глазного дна; создание функционального покоя при воспалительных заболеваниях глаза, при травмах глаза.
Способ применения и режим дозирования	По 1-2 капли в глаз, до 3 раз в день с интервалом 5-6 часов. Курс лечения устанавливается индивидуально врачом.
Побочные эффекты	Повышение внутриглазного давления, сухость во рту, тахикардия, гиперемия кожи век.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, глаукома, детский возраст до 7 лет, беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Противомиастенические средства, калия хлорид – усиление токсических эффектов. Фенилэфрин – повышение АД. Нитраты – повышение внутриглазного давления.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ	
Правила отпуска из аптеки	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 16.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на периферическую нервную систему.**Тема: Альфа-адреноблокаторы.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Сермион, таблетки, покрытые оболочкой 30 мг № 30
МНН	Ницерголин
Синонимическая замена (ТН)	Ницерголин
Аналоговая замена (ТН)	Вазобрал
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Блокирует альфа-адренорецепторы.
Основные фармакологические эффекты	Улучшение когнитивных функций, улучшает метаболические и гемодинамические процессы в головном мозге, снижает агрегацию тромбоцитов, повышает скорость кровотока в верхних и нижних конечностях.
Показания к применению	Симптоматическая терапия когнитивных нарушений
Способ применения и режим дозирования	Внутрь 1-2 таблетки утром во время еды, запивая небольшим объемом жидкости. Курс лечения устанавливается индивидуально врачом.
Побочные эффекты	Ощущение дискомфорта в животе, снижение АД, сонливость, головная боль, кожный зуд.
Противопоказания к применению	Недавно перенесенный инфаркт миокарда, выраженная брадикардия, возраст до 18 лет, беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Гипотензивные средства – усиление гипотензивного эффекта. Ацетилсалициловая кислота – увеличение времени кровотечения.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ	
Правила отпуска из аптеки	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 16.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на периферическую нервную систему.**Тема: Альфа2-адреномиметики.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Клофелин, таблетки 0.15 и 0,075 мг № 10, 20, 50
МНН	Клонидин
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	Эстулик
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Стимулирует альфа2-адренорецепторы.
Основные фармакологические эффекты	Уменьшение сопротивления периферических сосудов, снижение ЧСС и сердечного выброса, снижение АД.
Показания к применению	Артериальная гипертензия.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь во время или после еды, запивая небольшим количеством жидкости. В начале по 0,075 мг 2-3 раза в день, при необходимости дозу повышают через каждые 2 дня. Медленная отмена препарата в течении 1-2 недели.
Побочные эффекты	Головокружение, сонливость, головная боль, сухость во рту, запор, снижение аппетита, тошнота.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, брадикардия, артериальная гипотензия, возраст до 18 лет, беременность, лактация, употребление алкоголя.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Усиливает действие ЛС, угнетающих ЦНС. Бета-адреноблокаторы, блокаторы «медленных» кальциевых каналов и/или сердечные гликозиды повышают риск развития брадикардии.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ	Сильнодействующее вещество – клонидин, ПП РФ от 29.12.1997г. №964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ»
Правила отпуска из аптеки	По рецепту 148-1/у-88, хранится в аптеке 3 года.
Условия хранения в домашних условиях	В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 16.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на периферическую нервную систему.**Тема: Бета2-адреномиметики.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза – 90 доз
МНН	Сальбутамол
Синонимическая замена (ТН)	Вентолин, Асталин
Аналоговая замена (ТН)	Беротек
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Стимулирует бета2-адренорецепторы.
Основные фармакологические эффекты	Предупреждает и купирует бронхоспазм, увеличивает жизненную емкость легких.
Показания к применению	Предупреждение и купирование бронхоспазма при бронхиальной астме, ХОБЛ.
Способ применения и режим дозирования	1-2 ингаляции для купирования приступов. При отсутствии эффекта повторить через 5 мин. Для контроля за течением астмы по 1-2 ингаляции 1-4 раза в сутки.
Побочные эффекты	Тремор, головная боль, головокружение, умеренная тахикардия.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, нарушение ритма, пороки сердца, ИБС, СД, глаукома, детский возраст до 2-х лет, беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Ксантины – развитие тахиаритмий. Не рекомендуется принимать вместе с неселективными бета-адреноблокаторами.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ	
Правила отпуска из аптеки	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	Вдали от отопительной системы, защищенном от света месте при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 16.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на центральную нервную систему.**Тема: Анальгетики ненаркотические.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Диклофенак, гель для наружного применения 1%, суппозитории ректальные 50 и 100 мг, пластырь трансдермальный 30 мг/сут, таблетки 25 и 50 мг
МНН	Диклофенак
Синонимическая замена (ТН)	Вольтарен, Ортофен, Диклак
Аналоговая замена (ТН)	Кетопрофен
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Ингибирует активность фермента ЦОГ-1 и ЦОГ-2, угнетает синтез простагландинов.
Основные фармакологические эффекты	Анальгетическое, противовоспалительное.
Показания к применению	Боли в спине при воспалительных и дегенеративных заболеваниях позвоночника, боли в суставах, боль в мышцах, воспаление и отечность.
Способ применения и режим дозирования	Гель: наружно тонким слоем над очагом воспаления 3-4 раза в день. Табл.: внутрь во время или после еды по 1 табл. 2-3 раза в день. Пластырь: наклеивают на кожу над болезненной областью на 24 часа.
Побочные эффекты	Головная боль, головокружение, сонливость, бронхоспазм, диарея, отеки, повышенная потливость, дерматит, сыпь.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, бронхиальная астма, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ и ДПК, детский возраст до 12 лет (гель), до 6 лет (табл. 25 мг), до 15 лет (табл. 50 мг и пластырь), беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	С другими НПВС – образование язв. Парацетамол – повышается нефротоксичность.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта (гель, пластырь). По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке (табл., суппозитории).
Условия хранения в домашних условиях	При температуре от 15 до 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 17.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на центральную нервную систему.

Тема: Анальгетики наркотические.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Фентанил, трансдермальная терапевтическая система 25, 50, 75, 100 мкг/ч
МНН	Фентанил
Синонимическая замена (ТН)	Инстанил, Фендивия
Аналоговая замена (ТН)	Трамадол, Морфин
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Агонист опиоидных рецепторов, активирует эндогенную систему, повышает болевой порог, тормозит условные рефлексы, подавляет активность дыхательного центра.
Основные фармакологические эффекты	Анальгезирующий эффект.
Показания к применению	Выраженная хроническая боль, которая адекватно купируется только с помощью опиоидных анальгетиков.
Способ применения и режим дозирования	Плотно прижать ТТС ладонью на месте аппликации на 30 секунд, после наклеивания вымыть руки чистой водой. Одноразово держать 72 часа
Побочные эффекты	Угнетение дыхания, диарея, аллергические реакции, толерантность, «синдром отмены».
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, нарушения сознания, опухоли головного мозга, брадикардия, артериальная гипотензия, почечная и печеночная недостаточность, возраст до 18 года, беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Этанол, блокаторы H ₁ -гистаминовых рецепторов, обладающие седативным эффектом – повышают вероятность развития побочных. Бета-адреноблокаторы
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	Наркотическое вещество – фентанил, ПП РФ от 30.06.98 №681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», список II
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 148-1/у-88, хранится в аптеке 5 лет.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре от 15 до 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 17.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на центральную нервную систему.**Тема: Снотворные средства.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Имован, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7.5 мг №20
МНН	Зопиклон
Синонимическая замена (ТН)	Торсон, Сомнол.
Аналоговая замена (ТН)	Анданте, Фенобарбитал.
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Более избирательно связываются с ГАМК-рецепторами и потенцируют тормозное влияния ГАМК в ЦНС.
Основные фармакологические эффекты	Снотворный, седативный, транквилизирующий, противосудорожный и миорелаксирующий.
Показания к применению	Лечение переходящей, ситуационной и хронической бессонницы у взрослых.
Способ применения и режим дозирования	1 табл. за 15-30 мин. до сна. Курс по возможности кратковременный, но не более 17 недель.
Побочные эффекты	Горький привкус во рту, сухость во рту, головокружение, головная боль, остаточная сонливость после пробуждения, «синдром отмены».
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, дыхательная недостаточность, почечная недостаточность, синдром апноэ во сне, возраст до 18 лет, беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	С ЛП, угнетающие ЦНС – усиление угнетающего действия. Бупренорфин – повышенный риск угнетения дыхания, вплоть до летального исхода.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	Сильнодействующее вещество – зопиклон, ПП РФ от 29.12.1997г. №964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ»
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 148-1/у-88, хранится в аптеке 3 года.
Условия хранения в домашних условиях	В сухом месте при температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 17.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на центральную нервную систему.**Тема: Транквилизаторы.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Феназепам, таблетки 0,5 мг, 1 мг, 2,5 мг № 50
МНН	Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	Грандаксин, Нитразепам
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Стимулирует бензодиазепиновые рецепторы, повышает чувствительность ГАМК-рецепторов к медиатору, усиливает тормозное влияние ГАМК в ЦНС.
Основные фармакологические эффекты	Анксиолитический, седативно-снотворный, противосудорожный и центрально миорелаксирующий эффект.
Показания к применению	Невротические, невротоподобные психопатические, психопатоподобные и другие состояния. Также реактивные психозы, вегетативные дисфункции и расстройства сна. В качестве противосудорожного средства – височная и миоклоническая эпилепсия.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь: при нарушениях сна – 0,5 мг за 20-30 мин. до сна. Для лечения невротических состояний начальная доза – 0,5-1 мг 2-3 раза в день. Курс от 2 недель до 2 мес.
Побочные эффекты	Сонливость, головокружение, атаксия, лейкопения, сухость во рту или слюнотечение, запоры или диарея, привыкание.
Противопоказания к применению	Кома, шок, миастения, закрытоугольная глаукома, алкогольное или наркотическое отравление, беременность, период лактации, детский и подростковый возраст до 18 лет, гиперчувствительность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Снижает эффективность леводопы у больных паркинсонизмом. Повышает токсичность зидовудина. Взаимное усиление эффекта антипсихотических, снотворных средств, этанола.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, хранится в аптеке 3 месяца.
Условия хранения в домашних условиях	В сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 17.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.

Тема: ИАПФ.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Периндоприл, таблетки 4 и 8 мг № 30, 60, 90
МНН	Периндоприл
Синонимическая замена (ТН)	Престариум, Перинева
Аналоговая замена (ТН)	Эналаприл, Каптоприл
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Ингибитор фермента, превращающего ангиотензин I в ангиотензин II (АПФ). Уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление.
Основные фармакологические эффекты	Гипотензивный, вазодилатирующий, натрийуретический.
Показания к применению	Артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, цереброваскулярные заболевания, стабильная ИБС.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь, утром 1 раз в день перед едой. Начальная доза – 2 мг. Максимальная 8 мг в сутки.
Побочные эффекты	Головокружение, головная боль, парестезия, вертиго, нарушения зрения, шум в ушах, чрезмерное снижение АД, кашель, одышка, боль в животе, запор, диарея, диспепсия, тошнота, рвота, кожный зуд, сыпь, спазмы мышц и астения.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, ангионевротический отек, одновременное применение с алискиреном, беременность, период кормления грудью, возраст до 18 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Препараты, содержащие калий – повышает риск гиперкалиемии.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 18.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.**Тема: Блокаторы рецепторов ангиотензина II.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Лозартан, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25, 50, 100 мг № 30, 60, 90
МНН	Лозартан
Синонимическая замена (ТН)	Лориста, Лозап
Аналоговая замена (ТН)	Валсартан, Вальсакор
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Блокирует ангиотензин II в различных тканях.
Основные фармакологические эффекты	Уменьшает артериальную вазоконстрикцию, снижает АД
Показания к применению	Артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, снижение риска развития инсульта
Способ применения и режим дозирования	Внутри вне зависимости от приема пищи. 50 мг 1 раз в день. Максимальная суточная доза 100 мг.
Побочные эффекты	Головокружение, вертиго, гиперкалиемия, астения, утомление, головная боль, бессонница, анемия.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Взаимно усиливает эффект других гипотензивных средств. Повышает риск гиперкалиемии при совместном применении с калийсберегающими диуретиками и препаратами калия.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 18.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.

Тема: Блокаторы «медленных кальциевых каналов».

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Коринфар, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 30, 50, 100
МНН	Нифедипин
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	Верапамил, Дилтиазем
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Блокирует «медленные» кальциевые каналы. Тормозит поступление ионов кальция в клетки гладкой мускулатуры артериальных сосудов и кардиомиоцитов.
Основные фармакологические эффекты	Антиангинальный, гипотензивный.
Показания к применению	Хроническая стабильная стенокардия, артериальная гипертензия
Способ применения и режим дозирования	Внутрь после еды 1 таблетка 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза 40 мг.
Побочные эффекты	Гиперемия лица с ощущением жара, сердцебиение, тахикардия, головокружение, головная боль, запор, припухлость и покраснение рук и ног.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, артериальная гипотензия, кардиогенный шок, коллапс, хроническая сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия, беременность, лактация, возраст до 18 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Нитраты, бета-адреноблокаторы, диуретики, трициклические антидепрессанты, фентанил — усиливают гипотензивный эффект. Дилтиазем замедляет метаболизм
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	В защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 18.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.

Тема: Диуретики, применяемые в терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Тиазидные и тиазидоподобные диуретики.

Лекарственный препарат (ТН). формы выпуска	Индапамид, таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг № 30, капсулы 2,5 мг № 30.
МНН	Индапамид
Синонимическая замена (ТН)	Арифон ретард, Индап
Аналоговая замена (ТН)	Гидрохлортиазид, Фуросемид, Верошпирон, Спиронолактон
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Ингибирует обратную абсорбцию ионов натрия, увеличивает выделение с мочой ионов натрия, хлора, кальция и магния. Угнетает ток ионов кальция в гладкомышечные клетки сосудистой стенки и, таким образом, уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление.
Основные фармакологические эффекты	Диуретический, гипотензивный, вазодилатирующий.
Показания к применению	Артериальная гипертензия.
Способ применения и режим дозирования	1 таблетка 1 раз в сутки, желательно утром, запивая водой.
Побочные эффекты	Головная боль, головокружение, слабость, повышенная утомляемость, ринит, кашель, гриппоподобный синдром, боль в грудной клетке, боль в спине, потливость, снижение массы тела.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, тяжелая почечная недостаточность, гипокалиемия, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, непереносимость лактозы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Препараты лития из-за возможности развития токсического эффекта лития на фоне снижения его почечного клиренса. С сердечными гликозидами повышается вероятность развития дигиталисной интоксикации; с препаратами кальция — гиперкальциемии.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 18.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.

Тема: Петлевые диуретики.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Фуросемид, таблетки 40 мг № 20, 50; раствор для инъекций 1%-2мл №10
МНН	Фуросемид
Синонимическая замена (ТН)	Лазикс
Аналоговая замена (ТН)	Торасемид, Гидрохлортиазид, Верошпирон
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Блокирует активный транспорт натрия, калия, хлора в толстом сегменте восходящего колена петли Генле. Угнетает реабсорбция натрия хлорида в этом отделе петли Генле.
Основные фармакологические эффекты	Диуретический, натрийуретический.
Показания к применению	Отечный синдром при хронической сердечной и почечной недостаточности, острая почечная недостаточность, артериальная гипертензия.
Способ применения и режим дозирования	Натошак, 1 таблетка 1 раз в сутки, запивая водой. В/в 1-2 раза в день с интервалом 4 часа.
Побочные эффекты	Гемоконцентрация, нарушения водно-электролитного баланса, гипохлоремия, гипокалемия, гипонатриемия, печеночная энцефалопатия, снижение АД, увеличение объема мочи.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, почечная недостаточность с анурией, тяжелая печеночная недостаточность, печеночная кома и прекома, тяжелое нарушение электролитного баланса, детский возраст до 3-х лет, беременность, период грудного вскармливания.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Аминогликозиды, этакриновая кислота и цисплатин повышают ототоксичность. При назначении высоких доз салицилатов увеличивается риск развития салицилизма, сердечных гликозидов — гипокалиемии и связанной с ней аритмии, кортикостероидов — электролитного дисбаланса.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	В защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 18.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.

Тема: Бета1-адреноблокаторы.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Локрен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 28, 56
МНН	Бетаксолол
Синонимическая замена (ТН)	Бетоптик, Бетак
Аналоговая замена (ТН)	Конкор, Эгилок, Небилет.
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Блокирует бета1-адренорецепторы.
Основные фармакологические эффекты	Снижает ЧСС, силу сердечных сокращений, сердечный выброс, АД и потребность миокарда в кислороде.
Показания к применению	Артериальная гипертензия, профилактика приступов стенокардии.
Способ применения и режим дозирования	½ таблетки 1 раз в день в течении 7-14 дней. Последующее лечение предусматривает увеличение дозы до 20 мг в сутки.
Побочные эффекты	повышенная утомляемость, слабость, головокружение, головная боль, сонливость или бессонница, брадикардия, сердцебиение, ортостатическая гипотензия, сухость слизистых оболочек полости рта.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, бронхиальная астма, острая сердечная недостаточность, брадикардия, артериальная гипотензия, возраст до 18 лет, беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Амиодарон – нарушения сократимости, автоматизма и проводимости. Сультоприд – выраженная брадикардия. Баклофен – усиление антигипертензивного действия.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 18.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.

Тема: Нитраты.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Нитроглицерин, таблетки подъязычные 0,5 мг № 20, 40.
МНН	Нитроглицерин
Синонимическая замена (ТН)	Перлинганит, Тринитролог, Нитрокор, Нитроминт.
Аналоговая замена (ТН)	Кардикет, Изокет.
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	За счет образования из нитратов оксида азота вызывает вазодилатацию (расширение сосудов), расслабление гладкой мускулатуры сосудов, уменьшает приток крови к сердцу и снижает потребность миокарда в кислороде.
Основные фармакологические эффекты	Антиангинальное, сосудорасширяющее, коронародилатирующее.
Показания к применению	Купирование приступов стенокардии, кратковременная профилактика приступов стенокардии.
Способ применения и режим дозирования	1 таблетка под язык до полного рассасывания.
Побочные эффекты	Приливы крови к лицу, сердцебиение, тахикардия, головная боль, головокружение, сухость во рту, гипотермия, ощущение жара.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, непереносимость лактозы, шок, возраст 18 лет, беременность, кормление грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Салицилаты повышают уровень нитроглицерина в плазме, барбитураты ускоряют метаболизм. Гипотензивные, антиадренергические препараты, вазодилататоры, антагонисты кальция, этанол, хинидин и новокаиномид усиливают гипотензивный и системный вазодилатирующий эффекты.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	В сухом, защищённом от света месте при температуре от 15 до 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 18.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов дыхания.**Тема: Муколитические средства.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Амброксол, таблетки 30 мг № 20, 30, 50;
МНН	Амброксол
Синонимическая замена (ТН)	Амбробене, Лазолван
Аналоговая замена (ТН)	АЦЦ, Бромгексин, Бронхобос
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Увеличивает секрецию в дыхательных путях, усиливает ток и транспорт слизи.
Основные фармакологические эффекты	Отхаркивающее, муколитическое.
Показания к применению	Острый и хронический бронхит, пневмония, ХОБЛ, бронхиальная астма с затрудненным отхождением мокроты.
Способ применения и режим дозирования	Взрослым и детям от 12 лет: 1 таблетка 3 раза в сутки. Детям от 6 до 12 лет ½ таблетки 2-3 раза в сутки.
Побочные эффекты	Тошнота, снижение чувствительности в полости рта и глотки, нарушение вкусовых ощущений.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, наследственная непереносимость лактозы, I триместр беременности и кормление грудью, детский возраст до 6 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Совместное применение с противокашлевыми ЛС может приводить к затруднению отхождения мокроты на фоне уменьшения кашля. Увеличивает проникновение в бронхиальный секрет амоксициллина, цефуроксима, эритромицина и доксициклина.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 19.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов дыхания.**Тема: Отхаркивающие средства.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Геделикс, сироп 100 мл, капли для приема внутрь 50 мл.
МНН	Плюща обыкновенного листьев экстракт
Синонимическая замена (ТН)	Туспан, Проспан
Аналоговая замена (ТН)	Бронхикум, Туссин
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Слабое противомикробное и противовоспалительное действие.
Основные фармакологические эффекты	Отхаркивающий.
Показания к применению	Отхаркивающее при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и бронхов, сопровождающих кашлем с трудно отделяемой мокротой.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь после еды 5 мл 3 раза в день. Внутрь по 31 капле 3 раза в день после еды, запивая 1 стаканом воды. Курс не менее 7 дней.
Побочные эффекты	Аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, наследственная непереносимость фруктозы, беременность и кормление грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми ЛС, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	В защищённом от света месте при температуре от 5 до 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 19.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов дыхания.**Тема: Противокашлевые ненаркотические средства.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Синекод, сироп 1,5 мг/мл флаконы 100 и 200 мл.
МНН	Бутамират
Синонимическая замена (ТН)	Омнитус
Аналоговая замена (ТН)	Бронхолитин, Стоптуссин, Коделак.
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Снижает возбудимость кашлевого центра.
Основные фармакологические эффекты	Противокашлевой, бронхолитический.
Показания к применению	Симптоматическое лечение сухого кашля.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь, перед едой. Детям от 3 до 6 лет: 5 мл 4 раза в день; от 6 до 12 лет: по 10 мл 3 раза в день; 12 лет и старше: по 15 мл 3 раза в день. Взрослым по 16 мл 4 раза в день.
Побочные эффекты	Сонливость, головокружение, тошнота, диарея, экзантема, аллергические реакции.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, детский возраст до 3 лет, беременность (I триместр), период лактации.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Не рекомендуется применять снотворные средства и ЛС, угнетающие ЦНС.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 30 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 19.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов дыхания.

Тема: Противокашлевые наркотические средства.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Терпинкод, таблетки, № 10.
МНН	
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	Коделак, Стоптуссин, Бронхолитин
Комбинированные препараты (ГН)	Кодеин+Натрия гидрокарбонат+Терпингидрат
Механизм действия	Уменьшает возбудимость кашлевого центра, усиливает секрецию бронхиальных желез.
Основные фармакологические эффекты	Противокашлевой, отхаркивающий.
Показания к применению	«Сухой» кашель различной этиологии при заболеваниях легких и дыхательных путей.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь, по 1 таблетке 2-3 раза в день. Максимальная продолжительность лечения без консультации врача – 5 сут.
Побочные эффекты	Аллергические реакции (кожный зуд, крапивница). Тошнота, рвота, запоры, головная боль, сонливость. При длительном бесконтрольном применении возможно развитие зависимости к кодеину.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, одновременный прием этанола или наркотических анальгетиков, детский возраст до 12 лет, беременность и период лактации.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Хлорамфеникол тормозит метаболизм кодеина в печени и тем самым усиливает его действие. При одновременном применении ЛС, угнетающих ЦНС возможно усиление седативного эффекта и угнетающего действия на дыхательный центр.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	Комбинированное ЛС, в составе которого кодеин до 20 мг – терпинкод, Приказ МЗ РФ от 17.05.2012г. №562н п.5 «Об утверждении отпуска ЛП, содержащих кроме малых количеств наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические активные вещества»
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 148-1/у-88, хранится в аптеке 3 года.
Условия хранения в домашних условиях	В сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 19.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Тема: Прокинетические и противорвотные средства.

Тема: Прокинетические и противорвотные средства.

Дата заполнения: 20.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов пищеварения.**Тема: Ферментные препараты.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Панкреатин, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, № 20, 60, 80.
МНН	Панкреатин
Синонимическая замена (ТН)	Креон 10 000, Креон 25 000, Креон 40 000, Мезим форте, Эрмиталь 10000, Эрмиталь 25000.
Аналоговая замена (ТН)	Абомин
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Облегчает переваривание углеводов, жиров и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонкой кишке.
Основные фармакологические эффекты	Восполняющий дефицит ферментов поджелудочной железы.
Показания к применению	Улучшение пищеварения, недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря.
Способ применения и режим дозирования	По 1-2 таблетки во время еды, не разжевывая.
Побочные эффекты	Аллергические реакции, диарея, боль в животе, тошнота.
Противопоказания к применению	Острый панкреатит, гиперчувствительность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	При одновременном применении с препаратами железа возможно уменьшение абсорбции железа.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 20.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов пищеварения.**Тема: Слабительные средства: осмотические.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Фортранс, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 64 г.
МНН	Макрогол
Синонимическая замена (ТН)	Форлакс, Микролакс плюс, Сенаде
Аналоговая замена (ТН)	
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Увеличивается осмотическое давление и объем кишечного содержимого.
Основные фармакологические эффекты	Слабительное.
Показания к применению	Подготовка к эндоскопическому или рентгенологическому исследованию толстой кишки, к оперативным вмешательствам, требующим отсутствия содержимого в кишечнике.
Способ применения и режим дозирования	Перед применением содержимое 1 пакета полностью растворяют в 1 л воды. Дозу препарата устанавливают из расчета 1 л приготовленного раствора на 15-20 кг массы тела (в среднем 3-4 л раствора).
Побочные эффекты	Тошнота, рвота, вздутие живота, аллергические реакции, анафилактический шок.
Противопоказания к применению	Тяжелое состояние пациента, наличие злокачественной опухоли или другого заболевания толстой кишки, сопровождающегося обширным поражением слизистой оболочки кишечника, полная или частичная кишечная непроходимость, возраст до 15 лет, гиперчувствительность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Нарушает абсорбцию других препаратов.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Дата заполнения: 21.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов пищеварения.**Тема: Слабительные средства: раздражающие рецепторы кишечника.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Сенаде, таблетки 13,5 мг № 40, 60
МНН	Сеннозиды А и В
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Раздражает рецепторы кишечника и усиливают перистальтику кишечника.
Основные фармакологические эффекты	Слабительный.
Показания к применению	Запоры, геморрой.
Способ применения и режим дозирования	1 раз/сут вечером перед сном, запивая водой или каким-либо напитком. Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таб. 1 раз/сут. Детям в возрасте 6-12 лет назначают по 1/2 таб. 1 раз/сут и при необходимости увеличивают дозу до 1-2 таб.
Побочные эффекты	Коликообразные боли в животе, метеоризм, отложение меланина в слизистой оболочке кишечника, тошнота, рвота, диарея, нарушения водно-электролитного обмена, альбуминурия, гематурия, обесцвечивание мочи, судороги, утомляемость, кожная сыпь, сосудистый коллапс.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, запор, кишечная непроходимость, цистит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	При длительном применении в высоких дозах возможно усиление действия сердечных гликозидов и влияние на действие антиаритмических препаратов в связи с возможностью развития гипокалиемии. При одновременном применении с тиазидными диуретиками, ГКС, препаратами корня солодки увеличивается риск развития гипокалиемии.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	Хранить в недоступном для детей, сухом месте при температуре не выше 30°C.

Дата заполнения: 21.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов пищеварения.**Тема: Гепатотропные средства: холекинетики.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Магния сульфат, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10, 20, 25, 50 мг;
МНН	Магния сульфат
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Уменьшает высвобождение ацетилхолина из нервно-мышечных синапсов. Блокирует медленные кальциевые каналы.
Основные фармакологические эффекты	Противосудорожный, антиаритмический, токолитический, гипотензивный эффект. Сокращение желчного пузыря и расслабление сфинктеров с выбросом желчи из пузыря.
Показания к применению	Запоры, холангит, холецистит, дискинезия желчного пузыря по гипотоническому типу, дуоденальное зондирование, артериальная гипертензия, эклампсия, отравление солями тяжелых металлов.
Способ применения и режим дозирования	Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы. Предназначен для приема внутрь, в/м и в/в (медленного) введения, введения через дуоденальный зонд.
Побочные эффекты	Брадикардия, диплопия, внезапный прилив крови к лицу, головная боль, снижение АД, тошнота, одышка, рвота, слабость, тошнота, рвота, диарея, метеоризм, абдоминальная боль спастического характера, жажда, головокружение.
Противопоказания к применению	Хроническая почечная недостаточность тяжелой степени, гиперчувствительность, аппендицит, артериальная гипотензия, угнетение дыхательного центра, предродовый период (за 2 ч до родов).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	При парентеральном применении магния сульфата и одновременном применении миорелаксантов периферического действия происходит усиление эффектов миорелаксантов периферического действия.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 21.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов пищеварения.

Тема: Гепатотропные средства: холесекреттики.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Аллохол, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 20, 50, 28, 56.
МНН	
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	Танацехол, Фламин, Холензим
Комбинированные препараты (ГН)	Активированный уголь+Желчь+Крапивы двудомной листья+Чеснока посевного луковицы
Механизм действия	Снижает процессы гниения и брожения в кишечнике, усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов ЖКТ.
Основные фармакологические эффекты	Желчегонное (холекинетическое и холеретическое).
Показания к применению	Хронический реактивный гепатит, холангит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, атонические запоры, постхолецистэктомический синдром.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь, после еды, по 1-2 таб. 3-4 раза/сут в течение 3-4 нед; при обострении - по 1 таб. 2-3 раза/сут в течение 1-2 мес. Повторные курсы проводят с интервалом в 3 мес.
Побочные эффекты	Диарея, аллергические реакции.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, калькулезный холецистит, обтурационная желтуха, острый гепатит, острая и подострая дистрофия печени, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, острый панкреатит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Препараты, содержащие алюминия гидроксид, колестирамин, колестипол снижают абсорбцию и уменьшают эффект препарата.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 21.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на функции органов пищеварения.

Тема: Гепатопротекторы.

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Эссенциале форте Н, капсулы 300 мг, № 30, 90, 180.
МНН	Фосфолипиды
Синонимическая замена (ТН)	Эссенциале Н, Эссливер
Аналоговая замена (ТН)	Гептрал, Гептор
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Способствует регенерации печеночных клеток за счет встраивания в них фосфолипидов.
Основные фармакологические эффекты	Гепатопротекторный, антиоксидантный, антитоксический.
Показания к применению	Хронические гепатиты, цирроз печени, жировая дистрофия печени различной этиологии, токсические поражения печени, алкогольный гепатит, нарушения функции печени при других соматических заболеваниях, токсикоз беременности, профилактика рецидивов образования желчных камней.
Способ применения и режим дозирования	Для подростков старше 12 лет и с массой тела более 43 кг, а также для взрослых рекомендуется принимать по 2 капсулы 3 раза/сут во время еды. Продолжительность применения не ограничена.
Побочные эффекты	Чувство дискомфорта в желудке, мягкий стул, диарея, аллергические реакции.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, возраст до 12 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Необходимо скорректировать дозу антикоагулянтов при совместном применении с препаратом.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 21°C.

Дата заполнения: 21.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:

Раздел практики: Средства, влияющие на систему крови.**Тема: Гемостатики растительного происхождения.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Крапивы листья, листья измельченные 40, 50, 75, 100 мг
МНН	Крапивы двудомной листья
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Стимуляция эритропоэза, диуретическое действие, повышает сократительную способность гладкой мускулатуры матки.
Основные фармакологические эффекты	Диуретическое, нормализация липидного обмена, желчегонное, противовоспалительное.
Показания к применению	Инфекции мочевого тракта, мочекаменная болезнь, ревматизм, кровотечения, атеросклероз, железодефицитная анемия, симптоматическое лечение при увеличении предстательной железы.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь в виде приготовленного настоя 3 раза/сут.
Побочные эффекты	Аллергические реакции, слабовыраженные нежелательные явления со стороны ЖКТ.
Противопоказания к применению	Задержка жидкости в организме вследствие нарушений деятельности сердца или функции почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	При одновременном применении экстракта листьев крапивы и диклофенака возможно усиление действия последнего.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	В сухом, защищенном от света месте; приготовленный настой - в прохладном месте не более 2-х суток. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 23.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на систему крови.**Тема: Средства лечения гипохромных (железодефицитных) анемий.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Мальтофер, таблетки жевательные, № 10, 30.
МНН	
Синонимическая замена (ТН)	Феррум Лек
Аналоговая замена (ТН)	Тотема, Сорбифер дурулес
Комбинированные препараты (ГН)	Железа [III] гидроксид полимальтозат
Механизм действия	Нормализует содержание гемоглобина, восполняет дефицит железа.
Основные фармакологические эффекты	Восполнение дефицита железа.
Показания к применению	Лечение дефицита железа без анемии и лечение клинически выраженной железодефицитной анемии, повышенная потребность в железе при беременности, в период грудного вскармливания, донорства крови, интенсивного роста, вегетарианства и пожилого возраста.
Способ применения и режим дозирования	Разжевывать или глотать целиком. Суточная доза препарата зависит от степени дефицита железа
Побочные эффекты	Головная боль, диарея, тошнота, диспепсия, рвота, запор, боль в животе.
Противопоказания к применению	Установленная гиперчувствительность к железу (III) гидроксид полимальтозату или к любому вспомогательному веществу, перегрузка железа, нарушение утилизации железа, анемия, не связанная с дефицитом железа, детский возраст до 12 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Избегать одновременного применения препаратов железа для парентерального введения и приема внутрь.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Дата заполнения: 23.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на систему крови.**Тема: Антиагреганты.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Эгитромб, таблетки покрытые пленочной оболочкой 75 мг № 14, 28
МНН	Клопидогрел
Синонимическая замена (ТН)	Зилт, Плавикс
Аналоговая замена (ТН)	Тикло, Брилинта
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Препятствует связи тромбоцитов с тромбоцитарными рецепторами.
Основные фармакологические эффекты	Антиагрегантный.
Показания к применению	Стенокардия, инфаркт миокарда, ишемический инсульт.
Способ применения и режим дозирования	Внутрь первая доза 300 мг 1 раз в сутки, последующие дни по 75 мг 1 раз в сутки
Побочные эффекты	Кровотечения, головная боль, головокружение, гематомы, боль в животе, диспепсия.
Противопоказания к применению	Печеночная недостаточность, кровотечения, беременность, детский возраст до 18 лет, гиперчувствительность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Лекарственные средства, применение которых ассоциируется с риском развития кровотечения – повышенный риск развития кровотечения. Варфарин – увеличивает риск кровотечения.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 24.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Средства, влияющие на систему крови.**Тема: Антикоагулянты прямого действия.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Гепарин, гель для наружного применения 30 г; раствор для П/к, в/в введения 5 мл № 10
МНН	Гепарин натрия
Синонимическая замена (ТН)	Лиотон
Аналоговая замена (ТН)	Курантил, Брилинта, Фраксипарин
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Нейтрализует факторы свертывания крови.
Основные фармакологические эффекты	Антикоагулянтный.
Показания к применению	Тромбофлебит поверхностных вен, подкожная гематома, травмы, ушибы суставов, сухожилий, мышечной ткани.
Способ применения и режим дозирования	Наружно тонким слоем 1-3 раза в сутки. П/к, в/в по 5 мл. Курс не более 14 дней.
Побочные эффекты	Головокружение, головная боль, аллергические реакции, гиперемия кожи, снижение аппетита, тошнота, рвота, диарея.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, гнойные процессы на коже, травматическое нарушение целостности кожных покровов.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Антигистаминные ЛС снижают антикоагулянтный эффект.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 24.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики: 

Раздел практики: Гормональные препараты.**Тема: Глюкокортикостероиды для местного применения.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Акридерм ГК, мазь для наружного применения
МНН	
Синонимическая замена (ТН)	Тридерм, Кандидерм
Аналоговая замена (ТН)	Травокорт, Акридерм СК, Белосалик
Комбинированные препараты (ГН)	Бетаметазон+Гентамицин+Клотримазол
Механизм действия	Антибиотик широкого спектра бактерицидного действия, ГКС, нарушает синтез эргостерина у грибов.
Основные фармакологические эффекты	Противовоспалительный, противоаллергический, противогрибковый, антибактериальный.
Показания к применению	Дерматит простой и аллергический, диффузный нейродермит, ограниченный нейродермит, экзема, дерматомикозы, особенно при локализации в паховой области и крупных складках кожи.
Способ применения и режим дозирования	Крем или мазь наносят на пораженные участки кожи в небольшом количестве, слегка втирая, 2 раза/сут. При дерматомикозе стоп средняя продолжительность лечения составляет 2-4 недели.
Побочные эффекты	Зуд, чувство жжения, раздражение, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, стероидные угри, гипопигментация, аллергические реакции, гипергликемия, бессонница, дисменорея.
Противопоказания к применению	Туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, ветряная оспа, простой герпес, кожные поствакцинальные реакции, открытые раны, детский возраст до 2 лет, гиперчувствительность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	Хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Дата заполнения: 25.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Гормональные препараты.**Тема: Препараты гормонов щитовидной железы.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Эутирокс, таблетки 25, 50, 75, 100 мкг № 50
МНН	Левотироксин натрия
Синонимическая замена (ТН)	L-тироксин
Аналоговая замена (ТН)	Йодбаланс, Йодомарин, Калия йодид
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Восполняющий дефицит гормонов щитовидной железы.
Основные фармакологические эффекты	Восполняющий дефицит гормонов щитовидной железы.
Показания к применению	Гипотиреозные состояния различной этиологии, рак щитовидной железы после оперативного лечения
Способ применения и режим дозирования	100-200 мкг 1 раз в день.
Побочные эффекты	Аллергические реакции.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, нелеченный тиреотоксикоз, острый инфаркт миокарда, острый миокардит, нелеченная недостаточность коры надпочечников.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Снижает эффект инсулина и пероральных противодиабетических препаратов, сердечных гликозидов, усиливает — непрямым антикоагулянтов, трициклических антидепрессантов. Колестирамин, колестипол, гидроокись алюминия уменьшают плазменную концентрацию за счет торможения всасывания в кишечнике.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 25.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Гормональные препараты.**Тема: Средства лечения сахарного диабета II типа.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Глюкофаж, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500, 850, 1000 мг, № 120, 150, 240, 300.
МНН	Метформин
Синонимическая замена (ТН)	Сиофор
Аналоговая замена (ТН)	Манинил
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Повышает утилизацию глюкозы, тормозит инактивирование инсулина, улучшает связывание с рецепторами.
Основные фармакологические эффекты	Гипогликемический.
Показания к применению	Сахарный диабет II типа.
Способ применения и режим дозирования	2-3 раза в сутки во время еды.
Побочные эффекты	Нарушения вкуса, тошнота, кожные реакции, лактоацидоз.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, диабетический кетоацидоз, прекома и кома, почечная недостаточность или нарушение функции почек, печеночная недостаточность, хронический алкоголизм, острое отравление алкоголем, беременность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Противопоказанные комбинации: йодсодержащие рентгеноконтрастные средства, алкоголь.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 26.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Гормональные препараты.**Тема: Средства лечения сахарного диабета I типа.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Хумалог, раствор для подкожного введения 200 МЕ/мл
МНН	Инсулин лизпро
Синонимическая замена (ТН)	
Аналоговая замена (ТН)	НовоРapid
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Регуляция метаболизма глюкозы.
Основные фармакологические эффекты	Гипогликемический.
Показания к применению	Сахарный диабет I типа.
Способ применения и режим дозирования	Сразу до или после приема пищи п/к. Дозы подбираются индивидуально врачом.
Побочные эффекты	Аллергические реакции, гипогликемия, гипогликемическая кома.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, гипогликемия, инсулинома.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Действие инсулина снижается при сочетанном применении с пероральными контрацептивами, ГКС, йодсодержащими гормонами щитовидной железы.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 148-1/у-04 (л), хранится 3 года в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	Не замораживать, предохранять от прямых солнечных лучей и нагреваний. До первого применения хранить в холодильнике при температуре 2-8 °С. С момента первого применения: не хранить в холодильнике, хранить при температуре не выше 30 °С не более 28 дней. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 26.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Гормональные препараты.

Тема: Монофазные контрацептивы

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Линдинет 30, таблетки, покрытые оболочкой 75 мкг+30 мкг № 21, 63.
МНН	
Синонимическая замена (ТН)	Димиа
Аналоговая замена (ТН)	Ярина, Хлое, Силует
Комбинированные препараты (ГН)	Гестоден+Этинилэстрадиол
Механизм действия	Угнетает секрецию гонадотропных гормонов гипофиза и тормозит созревание фолликулов, препятствует процессу овуляции.
Основные фармакологические эффекты	Контрацептивный, подавление овуляции.
Показания к применению	Пероральная контрацепция.
Способ применения и режим дозирования	Таблетки следует принимать внутрь, запивая небольшим количеством воды. Назначают по 1 таблетке ежедневно в течение 21 дня, в определенном порядке, указанном на упаковке стрелками, примерно в одно и то же время суток.
Побочные эффекты	Головная боль, включая мигрень, "мажущие" кровянистые выделения/кровотечения, вагинит, новообразования, отеки, снижение/увеличение массы тела, перепады настроения, нервозность, изменение либидо, головокружение, тошнота, панкреатит, нарушения функции печени.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, сахарный диабет, опухоли, депрессия, эпилепсия.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Взаимодействие с ЛС, индуцирующими микросомальные ферменты печени системы цитохрома, в результате чего может увеличиваться клиренс половых гормонов.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 26.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики: 

Раздел практики: Гормональные препараты.

Тема: Двухфазные контрацептивы

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Фемостон 2, набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой 10 мг+2 мг
МНН	
Синонимическая замена (ТН)	Фемостон 1
Аналоговая замена (ТН)	Цикло-прогинова, Климонорм
Комбинированные препараты (ГН)	Эстрадиола валерат + дигидрогестерона
Механизм действия	Восполняет дефицит эстрогенов в женском организме в менопаузальном возрасте и уменьшает климактерические симптомы.
Основные фармакологические эффекты	Восполняет дефицит эстрогенов.
Показания к применению	Заместительная терапия у женщин в перименопаузе или в постменопаузе, профилактике постменопаузального остеопороза у женщин с высоким риском переломов.
Способ применения и режим дозирования	1 таблетка в сутки независимо от приема пищи.
Побочные эффекты	Головная боль, мигрень, головокружение, депрессия, нервозность, боль в животе тошнота, рвота, метеоризм напряжение/болезненность молочных желез, мажущие кровянистые выделения в постменопаузе, аллергические реакции, увеличение массы тела.
Противопоказания к применению	Беременность, период грудного вскармливания, диагностированный или предполагаемый рак молочной железы; тромбоз, тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Метаболизм эстрогенов и гестагенов может усиливаться при одновременном приеме с ЛС и противомикробными. ЛС растительного происхождения, содержащие зверобой продырявленный могут усиливать метаболизм эстрогенов и гестагенов.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C.

Дата заполнения: 26.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Противомикробные средства.**Тема: Синтетические противомикробные средства**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Стопдиар, таблетки и капсулы 200 мг № 30, суспензия 200 мг/5мл
МНН	Нифуроксазид
Синонимическая замена (ТН)	Энтерофурил, Эрсефурил, КонтрДиар
Аналоговая замена (ТН)	Макмирор, Фуразолидон
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Блокирует аэробное дыхание и синтез ДНК, РНК, белка, клеточной стенки, не нарушает флору в ЖКТ, не всасывается в ЖКТ.
Основные фармакологические эффекты	Антибактериальный.
Показания к применению	Острая бактериальная диарея без ухудшенного общего состояния.
Способ применения и режим дозирования	По 200 мг 4 раза в сутки. Курс 7 дней.
Побочные эффекты	Аллергические реакции.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, беременность, дети до 1 месяца.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Не рекомендуется одновременное применение нифуроксазида и ЛС, угнетающими функцию ЦНС.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	Без рецепта.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 27.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Противомикробные средства.**Тема: Фторхинолоны.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Левифлоксацин, таблетки покрытые пленочной оболочкой 250, 500 мг
МНН	Левифлоксацин
Синонимическая замена (ТН)	Глево, Флексид, Элефлокс
Аналоговая замена (ТН)	Авелокс, Фактив, Ципролет, Спарфло
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Ингибирует ДНК-гидразу и нарушает синтез ДНК и деление клетки.
Основные фармакологические эффекты	Антибактериальный.
Показания к применению	Пневмония, инфекции мочевыводящей системы, пиелонефрит, инфекции кожи и мягких тканей, сибирская язва, глазные инфекции, простатит, туберкулез, синусит, бронхит.
Способ применения и режим дозирования	Запивать большим количеством воды 1 таблетка в день, избегать свет.
Побочные эффекты	Аллергические реакции, нейротоксичность, гепатотоксичность, диспепсические расстройства.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Алюминий- и магнийсодержащие антациды снижают абсорбцию левифлоксацина. при одновременном применении левифлоксацина НПВС снижают порог судорожную готовность головного мозга. ГКС – повышает риск разрыва сухожилий.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С. в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 27.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Противомикробные средства.**Тема: Антибиотики пенициллинового ряда.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Амосин, капсулы и таблетки 250, 500 мг.
МНН	Амоксициллин
Синонимическая замена (ТН)	Флемоксин солютаб, Амоксициллин
Аналоговая замена (ТН)	Феноксиметилпенициллин, Амоксиклав
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Нарушает синтез клеточной стенки.
Основные фармакологические эффекты	Антибактериальный.
Показания к применению	Инфекции дыхательных путей и лор-органов, мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, инфекции ЖКТ, гонорея.
Способ применения и режим дозирования	Внутри до или после приема пищи 500 мг 3 раза в сутки.
Побочные эффекты	Гиперемия кожи, ринит, конъюнктивит, тошнота, рвота, изменение вкуса, диарея, беспокойство, бессонница, тахикардия.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, детский возраст до 3-х лет, беременность, лактация.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Снижает эффект эстрогенсодержащих пероральных контрацептивных препаратов. Повышает эффективность не прямых антикоагулянтов. Антациды снижают всасывание.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 27.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Противопротозойные средства.**Тема: Производные нитроимидазола.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Трихопол
МНН	Метронидазол
Синонимическая замена (ТН)	Метрогил, Клион
Аналоговая замена (ТН)	Наксоджин, Тинидазол
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Взаимодействует с ДНК микроорганизмов, ингибирует биосинтез ДНК и РНК, вызывая гибель бактерий.
Основные фармакологические эффекты	Антибактериальный.
Показания к применению	Протозойные инфекции, инфекции брюшной полости, инфекции кожи и мягких тканей, урогенитальный трихомониаз, смешанные инфекции
Способ применения и режим дозирования	Внутрь 250 мг 3-4 раза в сутки. Курс 7 дней.
Побочные эффекты	Диарея, снижение аппетита, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, аллергические реакции, дизурия, цистит.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, лейкопения, органические поражения ЦНС, печеночная недостаточность, беременность (I триместр), кормление грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Усиливает действие не прямых антикоагулянтов. При одновременном приеме с препаратами лития, может повышаться концентрация последнего в плазме и вероятность развития симптомов интоксикации. Фенитоин и фенobarбитал снижают действие метронидазола.
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 28.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Раздел практики: Противопротозойные средства.**Тема: Противогрибковые средства лечения дерматомикозов, онихомикозов, кандидоза, себореи.**

Лекарственный препарат (ТН), формы выпуска	Дифлюкан, капсулы 50, 150 мг, раствор для инфузий 2 мг/мл
МНН	Флуконазол
Синонимическая замена (ТН)	Дифлазон, Медофлюкан, Микомакс, Микосист
Аналоговая замена (ТН)	Тербинафин
Комбинированные препараты (ГН)	
Механизм действия	Нарушение синтеза эргостерола на 4 стадии.
Основные фармакологические эффекты	Противогрибковый.
Показания к применению	Дерматомикозы, онихомикозы, кандидозы, себореи, разноцветный лишай, криптококковый менингит.
Способ применения и режим дозирования	150 мг 1 раз в неделю. Курс 2-4 недели.
Побочные эффекты	Анемия, анафилаксия, головная боль, головокружение, изменение вкуса, тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, лейкопения, бессонница.
Противопоказания к применению	Гиперчувствительность, беременность, лактация, нарушение функций почек и печени, непереносимость лактозы, детский возраст до 2-х лет (капсулы до 3-х лет)
Взаимодействие с другими лекарственными средствами	Цизаприд – нежелательные реакции со стороны сердца. Терфенадин – серьезные аритмии
Наличие ЛП в списках наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, стоящих на ПКУ (указать регламентирующий документ)	
Правила отпуска из аптеки (форма рецептурного бланка, сроки его хранения в аптеке)	По рецепту 107-1/у, не хранится в аптеке.
Условия хранения в домашних условиях	При температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте.

Дата заполнения: 28.03.20

Подпись непосредственного руководителя практики:



Характеристика

Каверзиной Анастасии Дмитриевной

ФИО

обучающийся (ая) на _____ курсе по специальности

33.02.01 Фармация

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента
МДК 01.01. Лекарствоведение (6 семестр)

в объеме 72 часа с «16» марта 2020 г. по «28» марта 2020 г.

в организации АО «Губернские аптеки» ЦРА №3 Аптека №130
г. Красноярск, пр-т Мира, 132

наименование организации, юридический адрес

За время прохождения практики:

Общие/профессиональные компетенции ФГОС СПО	Критерии оценки	Оценка (0-2)
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.	Демонстрирует заинтересованность профессией, имеет сформированное представление о профессиональных обязанностях фармацевта, соблюдает трудовую дисциплину.	2
ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.	Регулярно ведет дневник и выполняет все виды работ, предусмотренные программой практики. Ответственно и правильно выполняет порученные задания.	2
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.	Правильно осуществляет подбор аналогов и синонимов лекарственных препаратов.	2
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.	Осуществляет поиск необходимой информации в справочниках лекарственных средств, государственном реестре лекарственных средств, нормативных документах.	2
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.	Использует в работе компьютерные программы.	2
ОК 6. Работать в коллективе и	Проявляет корректность и	2

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.	уважение, умеет эффективно общаться к сотрудникам аптеки, руководством, посетителями аптеки.	
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.	Ответственно и правильно выполняет порученные задания.	2
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.	Демонстрирует устойчивое стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, успеху.	2
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.	Демонстрирует толерантное (уважительное) отношения к представителям социальных, культурных и религиозных общностей.	2
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.	Соблюдает правила и нормы фармацевтической этики и деонтологии при отпуске лекарственных препаратов.	2
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.	Соблюдает правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.	2
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.	Владеет и применяет на практике правила приема и хранения лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента, в соответствии с действующей регламентирующей документацией.	2
ПК 1.2.. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.	Владеет порядком отпуска лекарственных средств, в соответствии с действующей регламентирующей документацией и грамотно осуществляет его на практике.	2
ПК.1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента.	Осуществляет реализацию товаров аптечного ассортимента согласно установленному порядку в данной аптечной организации. Работает с кассовым аппаратом, вежливо обслуживает посетителей аптеки.	2
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.	Правильно идентифицирует фармакологическую принадлежность лекарственных средств.	2


ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.	Грамотно, корректно информирует об имеющихся товарах аптечного ассортимента.	2
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.	Соблюдает правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.	2
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.	Владеет навыками оказания медицинской помощи.	2
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.	Осуществляет фармацевтическую экспертизу рецепта.	2
	Оценка: Итого баллов	38

« 28 » марта 2020 г.

Подпись непосредственного руководителя практики _____ /Кожукар Н.В.,
заведующая аптекой

Подпись общего руководителя практики _____ /Кожукар Н.В., заведующая
аптекой

М.П. аптечной организации



ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Ф.И.О. обучающегося Каверзина Анастасия Дмитриевна

Группа 301 Специальность Фармация

Проходившего производственную практику с 16.03 по 28.03 2020 г

На базе АО «Губернские аптеки» ЦРА №3 Аптека №130

Города/района г. Красноярск

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ:

А. Цифровой отчет

№	Виды работ	Количество
	Проанализирован ассортимент препаратов фармакологических групп	
1.	Средства, влияющие на периферическую нервную систему. М-холиноблокаторы. Альфа-адреноблокаторы. Альфа2-адреномиметики. Бета2-адреномиметики.	4
2.	Средства, влияющие на центральную нервную систему. Анальгетики наркотические и ненаркотические. Снотворные средства. Транквилизаторы.	4
3.	Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы. ИАПФ. Блокаторы рецепторов ангиотензина II. Блокаторы «медленных кальциевых каналов». Диуретики, применяемые в терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы. Тиазидные, тиазидоподобные, петлевые, калийсберегающие. Бета1-адреноблокаторы. Антиангинальные средства. Нитраты.	7
4.	Средства, влияющие на функции органов дыхания. Отхаркивающие и муколитические средства. Противокашлевые наркотические и ненаркотические средства.	4
5.	Средства, влияющие на функции органов пищеварения. Прокинетики и противорвотные средства. Анерексигенные средства. Ферментные препараты.	2
6.	Слабительные средства. Осмотические слабительные. Раздражающие рецепторы кишечника.	5

	Гепатотропные средства. Холекинетики. Холесекретерики. Гепатопротекторы.	
7.	Средства, влияющие на систему крови. Гемостатики растительного происхождения. Средства лечения гипохромных (железодефицитных) анемий.	2
8.	Антиагреганты. Антикоагулянты прямого действия.	2
9.	Гормональные препараты. Глюкокортикостероиды для местного применения. Препараты гормонов щитовидной железы. Антитиреоидные средства.	2
10.	Средства лечения сахарного диабета I и II типов. Оральные контрацептивы. Монофазные. Двухфазные. Трехфазные.	4
11.	Противомикробные средства. Синтетические противомикробные средства. Фторхинолоны. Антибиотики пенициллинового ряда. Макролиды.	3
12.	Противопротозойные средства. Производные нитроимидазола. Противогрибковые средства лечения дерматомикозов, онхомикозов, кандидоза, себореи.	2

Б. Текстовой отчет

Программа производственной практики выполнена в полном объеме.

За время прохождения практики:

1. закреплены знания: аналогов и синонимов лекарственных препаратов, взаимодействий ЛС, правил хранения, изготовления, приёма и отпуска ЛС;
2. отработаны практические умения: подбора аналогов и синонимов ЛП, осуществлять реализацию ЛС в соответствии с установленным порядком, работы с информационными ресурсами для поиска необходимой информации, идентифицировать фармакологическую принадлежность ЛС;
3. приобретён практический опыт: взаимодействия с сотрудниками аптечной организации, покупателями, работы с кассовым аппаратом, осуществления фармацевтической экспертизы рецепта, приёма ЛС, реализации ЛС;
4. выполнена самостоятельная работа в виде дневника практики.


Практика была пройдена успешно, оставила положительные впечатления. Коллектив аптечной организации создавал благоприятную среду для работы. Руководство принимало активное участие в обеспечении успешного прохождения практики. Периодически предоставлялись задания для выполнения программы практики.

Студент А. Каверин Каверин А. В.
(подпись) (ФИО)

Общий/непосредственный руководитель практики К
(подпись)

Котомаров Н. В.
(ФИО)

«28» марта 20 20 г.м.п.



Аттестационный лист производственной практики

Студент Каверзина Анастасия Дмитриевна

Обучающийся на 3 курсе группе

по специальности 33.02.01 Фармация

при прохождении производственной практики по МДК 01.01
Лекарствоведение ПМ 01. Реализация лекарственных средств и

товаров аптечного ассортимента

с 16 марта 2020г. по 28 марта 2020г. в объеме 72 часа

в организации АО «Губернские аптеки» ЦРА №3 Аптека №130

По результатам производственной практики:

- освоил общие компетенции ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ОК12
- освоил профессиональные компетенции ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.7, ПК 1.8
- не освоил компетенции: нет.

№ п/п	Этапы аттестации производственной практики	Оценка
1.	Оценка общего руководителя производственной практики	отл.
2.	Дневник практики	
3.	Индивидуальное задание	
4.	Дифференцированный зачет	
5.	Итоговая оценка по производственной практике	



28.03.20

общий руководитель

Кожокарь Н.В.

(подпись)

МП организации

28.03.20

методический руководитель

Медведева О.А.

(подпись)

МП учебного отдела

ПУТЕВКА

Обучающийся _____ III _____ курса 301-11 группы
Специальности _____ Фармация _____ направляются в (наименование
практической базы) АО "Бурятия Ассети" ЧРА №3 Аптека №130

г. Слюдянка, ул. Мира, 132

с « 16 » 03 2020 г. по « 28 » 03 2020 г.

МДК Лекарствоведение

Ф.И.О., должность общего руководителя Котлярь Н.В.

Ф.И.О., должности непосредственных руководителей практики

Котлярь Наталья Владимировна

Ф.И.О. методического руководителя Мухомов А.А.

Заведующий отделением

« 16 » 03 2020 г.

Агафонова И.П.

М.П.
образовательной
организации
деятельности



