

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лечебный факультет

Пролежни

Выполнили студенты 102 группы:
Малицкая Екатерина Алексеевна,
Надолоб Юлия Сергеевна,
Панкова Алина Сергеевна
Проверила: доцент, к.м.н.
Шарова Ольга Яновна

Красноярск, 2021

Актуальность

Профилактика пролежней
влияет на эффективность
лечения и является его
неотъемлемой частью ухода.



Цели и задачи

Цель - привлечь внимание и осведомить о данной проблеме медицинский персонал.


Задачи:

1. Повысить уровень осведомленности о профилактике пролежней.
2. Повысить уровень знаний о лечении пролежней.



Пролежень

Пролежень - это язвенно-некротические и дистрофические изменения тканей, возникающие на участках тела, которые подвергаются систематическому давлению, или образующиеся вследствие нейротрофических нарушений у ослабленных, длительно лежащих больных.



Причины возникновения:



1. Недостаточный уход за больным.
2. Слишком большой или слишком малый вес пациента.
3. Сухость кожи.

Причины возникновения:

- 4. Недержание мочи или кала.
- 5. Заболевания, приводящие к нарушению трофики (питания) тканей.
- 6. Анемия



Причины возникновения:

- 7. Ограниченная подвижность.
- 8. Повышение или понижение температуры тела.
- 9. Недостаточное белковое питание.



Места появления пролежней

Пролежни образуются в области:

1. Крестца
2. Лопаток
3. Пяток
4. Локтях
5. Седалищного бугра
6. Большого вертела бедренной кости
7. Ребер



Меры по профилактике:


1. Каждые 1.5 - 2 ч. следует менять положение.
2. Расправить складки на постели и белье.
3. Протирать кожу дезинфицирующим раствором.



Меры по профилактике:

4. Менять тут же мокрое или загрязненное постельное белье.

5. Во время умывать и подмывать больных.



Меры по профилактике:

6. Использовать подкладные резиновые круги и функциональные кровати.



Методы лечения:

Камфорный спирт (10 %)

Камфорным спиртом происходит обработка пролежней 1 и 2 стадии.



Методы лечения:

Бриллиантовый зелёный

1-2 % спиртовой раствор
бриллиантового зеленого
используется для обработки 2
стадии пролежней.



Методы лечения:

Перманганат калия

5-10 % раствор перманганата калия используется для обработки пролежней 2 стадии.

0,5 % раствор перманганата калия используется для лечения пролежней 4 стадии.



Методы лечения:

Раствор этилового спирта


70% раствор этилового спирта
пополам с водой используют для
обработки пролежней 2 стадии.



Методы лечения:

Мазь Вишневского

Мазь Вишневского
используется для обработки
пролежней 2 стадии.



Методы лечения:

Линимен синтомицин

Линимен синтомицин используется для обработки пролежней 2 стадии.



Методы лечения:

Мазевые повязки с 1% хлорамфенилковой эмульсией

Мазевые повязки с 1% хлорамфенилковой эмульсией используются для лечения пролежней 3 стадии.



Методы лечения:

Водорода перекись


3% раствор водорода перекиси
используется для лечения
пролежней 4 стадии.



Современные методы лечения:



Современные методы лечения:



Современные методы лечения:

3 фазы
эпителизации

суперабсорбирующая
повязка
Цетувит

Салфетки из
нетканного
материала
Медикомп

Сорбционная
самофиксирую-
щаяся повязка
Космопор Е

Повязка с
впитывающей
подушечкой
Гидрофильм
Плюс

Марлевая
салфетка
Стерилюкс

Современные методы лечения:

