

Функциональные взаимосвязи между локализацией функционально ослабленных мышц и дисфункцией конкретного меридиана

Мышца	Меридиан
Подлопаточная мышца	Сердца
Клювоплечевая мышца, передняя зубчатая мышца, дельтовидная мышца, поднимающая лопатку	Легких
Подколенная мышца	Желчного пузыря
Ключичная порция большой грудной, двуглавая плеча, флексоры шеи. экстензоры шеи, грудино-ключично-сосцевидная, жевательные, передняя лестничная, мышца, противопоставляющая мизинец, пронатор круглый и квадратный предплечья	Желудка
Широчайшая мышца спины, средняя и нижняя порция трапецевидной мышцы, трехглавая мышца плеча	Селезенки
Верхняя порция трапецевидной мышцы	Почек
Грудинная порция большой грудной мышцы, ромбовидная мышца	Печени
Портняжная мышца, камбаловидная мышца, икроножная мышца, стройная мышца, грушевидная мышца, аддукторы бедра, большая ягодичная мышца, задняя большеберцовая мышца	Перикарда
Четырехглавая мышца бедра, прямые мышцы живота	Тонкой кишки
Пояснично-подвздошная мышца	Почки
Квадратная мышца поясницы, экстензоры бедра, мышца, напрягающая широкую фасцию бедра	Толстой кишки
Большая круглая мышца	Задний срединный меридиан
Малая круглая мышца, полостная мышца	Тройного обогревателя
Надостная мышца	Передний срединный меридиан.
Малоберцовая длинная и короткая мышцы, передняя большеберцовая мышца	Мочевого пузыря

Функциональные нарушения меридианной системы вследствие патологической активности одного из меридианов

Патогенез - повышенная активность одного из меридианов и пониженная активность меридиана, с ним спаренного, несоответствующая времени активности и неустраняемая техникой восстановления часов тела.

Клиника -

А) слабость всех мышц, ассоциированных с данным меридианом, нарушение их статической и динамической активности, локализация боли в их укороченных антагонистах,

Б) наличие дисфункции внутреннего органа и функциональных блоков ПДС, соответствующих данным мышцам,

В) Преобладание эмоции, соответствующей данному меридиану.

Диагностика

-А- поиск меридиана, воздействие на который устранило бы повышенную активность меридиана

Основные 3 варианта диагностики

1. на основании тестирования функционально слабых мышц, ассоциированных с определенным меридианом

2. на основании тестирования сильных - индикаторных мышц