

Меридиан	Тонизирующая точка	Локализация	Седативная точка	Локализация
Легких	P-9	Передне-медиальная часть лучезапястного сустава	P-5	Передне-латеральная часть ямки
Толстой кишки	GI-11	Латеральная поверхность локтя	GI-2	Проксимальный сустав указательного пальца
Желудка	E-41	Передне-медиальная часть голеностопного сустава	E-45	С латеральной стороны кончика 2 пальца стопы
Селезенки и поджелудочной ж-зы	RP-2	Внутренний край кончика большого пальца стопы	RP-5	Передне-внутренняя часть голеностопного сустава
Сердца	C-9	Конец мизинца	C-7	Передне-медиальная часть
Тонкой кишки	IG-3	На тыле кисти у 5 пястно-фалангового сустава	IG-8	На локтевом отростке
Мочевого пузыря	V-67	Кончик мизинца стопы	V-65	В области 5 метатарзального
Почки	R-7	Над медиальной лодыжкой	R-1	На подошве
Перикарда	MC-9	Конец среднего пальца.	MC-7	Передне-медиальная часть
Тройного обогревателя	TR-3	На кисти, в середине задней поверхности	TR-10	У головки лучевой кости
Желчного пузыря	VB-43	Дистальнее 4 метатарзального сустава	VD-38	Середина малоберцовой кости
Печени	F-8	Медиальная часть колена	F-2	1 межпальцевый промежуток на стопе

### Алгоритм терапии акупунктурного дисбаланса при помощи воздействия на одну точку.

Алгоритм диагностики:

1. Определение сильной индикаторной мышцы без признаков сверхоблегченности (мышечное тестирование с использованием северного полюса магнита).
2. Определение наличия проблемы в акупунктурной системе в целом. Терапевтическая локализация на VC4 (3/5 пупочно-лобковой линии от уровня пупка) слабой индикаторной мышцы справа (или слева) - проблема акупунктурного дисбаланса с одноименной стороны.
3. Определение приоритетности меридианного дисбаланса в возникновении выявленной проблемы.

Тестирование из пункта 2 вновь повторяется, при этом пациент одновременно на второй руке касается верхушкой третьего пальца средней фаланги большого пальца. Если индикаторная мышца стала сильной, проблема меридианного дисбаланса приоритетна. Если индикаторная мышца осталась слабой - дисбаланс меридианной системы вторичен. Необходимо искать причину в структурных изменениях (подушечка большого пальца касается подушечки второго пальца), нарушениях питания - интоксикация, и/или дефицит веществ (контакт первого и третьего пальцев), эмоциональных проблемах (контакт первого и четвертого пальцев).

Диагностика пульса	Поверхностная пальпация	Глубокая пальпация
Слева	1. Меридиан тонкой кишки 2. Меридиан желчного пузыря 3. Меридиан мочевого пузыря	Меридиан сердца Меридиан печени Меридиан почки
Справа	3. Меридиан тройного обогревателя 2. Меридиан желудка 1. Меридиан легких	Меридиан перикарда Меридиан поджелудочной железы Меридиан толстого кишечника