

Мышца	Сублюксация	Фиксация	Орган	Меридиан	Время активнос-ти меридиана	Нейрологиче-ский зуб	Нейрососудистое обеспечение	Нейролимфатическое обеспечение	Точка тревоги	Питание	Особенности
Ромбовидная мышца	-	-	печень	печени	1-3.00	-	Билатерально 1,5-2 см. вверх от выпукоостей на передней поверхности лобной кости, 1,5-2см. от средней линии	Передний илр: в 6 межреберье слева от грудины к соску Задний илр: между поперечными отростками Т6 и 7 слева	Чуть выше верхнего соединяния лямбдоидального и сквамозного швов над теменной костью	Vit A, экстракты печени	
Портняжная мышца 2.49	Т-9	-	надпочечники	перикард	19-21.00	6 снизу	на сходе теменного и затылочного швов	Передний илр: 5 см. над пупком, 1,2 см. от средней линии Задний илр: Т11-12с обеих сторон около дуг позвонков	Затылочно-теменной шов по обе стороны от межтеменного	Экстракты надпочечников, тирозин Vit B.	
Камбаловидная мышца	-	-	надпочечники	перикард	19-21.00	-	Расположен над лямбдой	Передний илр: 5 см. выше и 2 см. латеральное пупка Задний илр: между остистыми отростками Т11 и Т12	Расположен чуть ниже шва вдоль затылочной кости	Экстракт надпочечников	
Икроножная мышца	-	-	надпочечники	перикард	19-21.00	-	Расположен над лямбдой	Передний илр: 5 см. выше и 2 см. латеральное пупка Задний илр: между остистыми отростками Т11 и Т12		Экстракт надпочечников, тирозин, Vit B6.	
Стройная мышца	-	-	надпочечники	перикард	19-21.00	1 снизу	Расположен над лямбдой	Передний илр: 5 см. выше и 2 см. латеральное пупка Задний илр: между остистыми отростками Т11 и Т12	находится на горизонтальной линии пересекающей лямбдоидный шов	экстракт надпочечников, ипацинамид	