

Мышца	Орган	Меридиан	Нейрологический зуд	Нейролимфатическое обеспечение	Точка тревоги	Питание	Особенности
Верхняя порция трапециевидной мышцы	-	глаз, ухо	по 1ки 17-19.00	Над соединением сphenoida и височной кости чуть выше скапулой арки	Передний шпр: а доль бициркулярного желобка плеча Задний шпр: над задней аркой I позвонка.	Лежит вдоль косой линии поднимающейся вверх от гlabelлы и распространяющегося латерально.	VitA, B, кальций и E.F.A.
Средняя и нижняя порции трапециевидной мышцы 1.65	T-7	T12-L1	Селезенка	9-11.00	8 сперху	На 2.5 см. выше лямбды над свиatalным швом	VitC, кальций, экстракты селезенки
Треуглавая мышца плеча	-	-	селезенка	9-11.00	-	На теменной кости выше височной и. издан от наружного спухового отверстия	Передний шпр: в 7-м межреберье у соединения реберного хрища Задний шпр: между поперечными отростками T7 и T8
Грудная большая грудной мышца 3.48	T-8	-	печень	печень 1-3.00	5 сперху	Бифатерально 1.5-2 см.аверх от выпуклостей на передней грудины справа, которое обычно поверхности любой kosti, 1.5-2 см. от средней линии.	Параллельно сагиттальному шву у его наиболее верхней трети
						Передний шпр: 5е межреберье пространство от сосковой линии и	Липотропные факторы, Vit A, экстракты печени
						грудная кость в области лобно-теменного шва мышины слева и справа.	
						Задний шпр: между T5-6, около дуги обычного спада	