

| Мышца | Функция | Орган | Меридиан | Насыщенные областечные | Точка тревоги | Питание | Особенности | | |
|-------|----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--|---|--|--|--|
| Мышца | Сгибатели | BPMEN SARTIBHOC-TH MEPHUNHNSA | Fisziologisch- escher Zahn | Hypoglossalne geoccygiale | Передний илр: в 1-м межреберье ниже ключицы и на 7.5 см. латеральнее грудино- ключичного сочленения Задний илр: над пластиной аксиа | Над рашой нижней челюсти под скапуловидной костью | Два краинальных стレス рецептора лежат на горизонтальной линии - один выше и кзади сосцевидного отростка, а другой у нижней его части | Пиридоксин, ниацинамид | Слабость экстензоров шен с одной стороны - фиксация КПС с этой же стороны, Слабость экстензоров шен с обоих сторона - фиксация крестца Слабость экстензоров в среднем положении головы - фиксация L1-L5. |
| Мышца | Флексоры | Любая кость. (ротация и, компресс ция) | Спины | Любые мышцы | 7-9.00 | 1 сверху | Два краинальных стレス рецептора лежат на горизонтальной линии - один выше и кзади сосцевидного отростка, а другой у нижней его части | Пиридоксин, ниацина МИД | |
| Мышца | Флексоры шеи | 2.64 | Любые мышцы | Любые мышцы | 7-9.00 | С двух сторон на ветви нижней челюсти | Передний илр: в 1-м межреберье ниже ключицы и на 7.5 см. латеральнее грудино- ключичного сочленения Задний илр: над пластиной аксиа | Слабость экстензоров шен с одной стороны - фиксация КПС с этой же стороны, Слабость экстензоров шен с обоих сторона - фиксация крестца Слабость экстензоров в среднем положении головы - фиксация L1-L5. | |
| Мышца | Гипоксии | - | L1-L5 | Любые мышцы | 7-9.00 | Любые мышцы | На телесной кости у чешуйчатого шипа кзади от просекки слухового протока | Передний илр: 7e межреберное пространство слева у реберно-хрящевого сочленения Задний илр: мышцу дугами T7-8 слева | |
| Мышца | Инерционный мышца спины | T-6 | Поджел уючая мышца | Поджел уючая мышца | 9-11.00 | Спины | На области крыла основной кости | | |