


10. ДИСБАЛАНС МЕРИДИАННОЙ СИСТЕМЫ

критерии баланса меридианной системы

1. Возникновение активности меридиана в соответствующее время суток.
2. Появление функциональной слабости мышц, ассоциированных с меридианом, являющимся активным в конкретный период времени
3. Появление функциональной слабости индикаторной мышцы и усиление ассоциированной мышцы возникает при -
 - а) терапевтической локализации на точке тревоги активного меридиана,
 - б) при раздражении седативной точки активного меридиана,
 - в) при линейном массаже против хода меридиана,
 - г) при расположении южного полюса магнита над седативной точкой активного меридиана.
4. При тестировании мышц, ассоциированных с неактивными меридианами, в момент исследования выявляется:
 - а) отсутствие функциональной слабости
 - б) отсутствие сверхоблегченности (локализация северного полюса магнита над брюшком вызывает функциональную слабость).
5. Отсутствие функциональной слабости индикаторной мышцы при терапевтической локализации на точке тревоги неактивного меридиана.
6. Появление функциональной слабости ассоциированной мышцы возникает при линейном массаже по ходу неактивного меридиана.



Функциональные нарушения меридианной системы вследствие дисбаланса энергии между каналами (дисфункция часов тела)

Патогенез Активность меридианов сменяет друг друга, но не соответствует времени, где находится данный пациент сейчас

Клиника - нарушены процессы сна и бодрствования, состояние постоянной слабости.

Причины - перелет в другую местность, ночная работа, преобладание в эмоциональной сфере негативных эмоций, нарушивших цикличность смены активности меридианов, патологическая активность одного из меридианов.