

6. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ

Терапевтическая локализация

Пальпаторный контакт руки пациента с поверхностью кожи на месте локализации остистого отростка, точек акупунктуры, висцерального органа и т.д., в результате которого появляется изменение силы мышцы.

Провокация

Увеличение активности имеющегося очага поражения посредством раздражения:

1. Механическое раздражение -
растяжение мышцы, давление на точку, смещение позвонка органа.
2. Химическое раздражение - локализация на кожу, слизистые оболочки химических веществ (токсинов, пищевых добавок).
3. Эмоциональное раздражение -
проговаривание вслух или мысленно слов, дат, воспроизведение событий.

ВАРИАНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ

Сублюксация	Фиксация
<p>(Функциональный блок мышечный)</p> <ul style="list-style-type: none"> • образован вследствие мышечного дисбаланса • возникает в тех позвонках, которые имеют ассоциативные связи с мышцами • визуальная оценка - асимметрия одного из позвонков • Терапевтическая локализация - на остистый отросток одного позвонка • Провокация - пассивное смещение остистого отростка в разные стороны, дыхание • Лечение - мобилизация пассивным смещением в сочетании с актом дыхания 	<p>(Функциональный блок суставный)</p> <ul style="list-style-type: none"> • образован вследствие дискового или внутрисуставного дисбаланса. • возникает в тех позвонках, которые с мышцами имеют приобретенные связи • визуальная оценка - асимметрии позвонков нет • Терапевтическая локализация - на остистые отростки двух соседних позвонков • Провокация пассивное смещение остистых отростков друг против друга или активное движение региона конечности или туловища • Лечение - манипуляция в направлении линейного смещения