


Профилактика

кори



Корь – острое инфекционное заболевание, которое проявляется температурой выше **39** градусов, сильной интоксикацией, болью в горле, кашлем и характерной сыпью.

Передача инфекции происходит воздушно – капельным путем.



Факт! После контакта с больным заражение происходит практически в **100 %** случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью.

Важно знать! Период от контакта с больным корью и до появления первых признаков болезни длится от **7** до **14** лет.

Симптомы кори:

- Повышение температуры
- Насморк
- Сухой навязчивый кашель
- Конъюнктивит
- Покраснение и отечность слизистой оболочки глотки
- Увеличение шейных лимфатических узлов
- Вялость, плохой сон
- Пятнисто – папулезная розовая сыпь на коже



Важно!!

Надежным и эффективным методом профилактики кори является **вакцинация**.

Первую вакцинацию проводят детям в возрасте 12 месяцев, вторую – в возрасте 6 лет.



Реакция на прививку:

➤ **Повышение температуры** – Не волнуйтесь! Эту реакцию можно считать нормальной, здесь жаропонижающие средства, обильное питье и прогулки на свежем воздухе.

➤ **Болезненный отёк на месте инъекции** – припухлость обычно проходит меньше чем за пару дней.

➤ **Увеличение лимфатических узлов**

➤ **Лёгкие аллергические реакции** – может появиться сыпь, отек или иные признаки повышенной чувствительности.



Как снизить вероятность реакции на прививки.

- ✓ Прививать только здорового ребенка.
- ✓ Рассказывать врачу перед вакцинацией о реакции на предыдущие прививки.
- ✓ Не посещать людных места, не контактировать с больными.
- ✓ Не уходить сразу после прививки, подождать 30-40 минут около прививочного кабинета.

