

Вакцинация детей до года



Одним из важнейших мероприятий, предпринимаемых для сохранения и укрепления здоровья детей, является

организация и проведение профилактических прививок.

Защиту организма от возбудителей инфекционных заболеваний осуществляет иммунная система. Она способна защитить ребёнка от постоянно окружающих нас микроорганизмов (кишечной палочки, стрептококков и других).

После прививки у некоторых детей может наблюдаться постпрививочная реакция, такая как: повышение температуры, покраснение или уплотнение в месте введения вакцины. Это закономерная реакция, которая говорит о начале формирования защиты от инфекции. Как правило, такая реакция носит кратковременный характер (1-3 дня). При повышении температуры до 38 градусов не требуется никакого лечения. Если температура повысится выше 38 градусов, необходимо использовать жаропонижающие средства, их назначения сделает участковый педиатр, в соответствии с возрастом вашего ребёнка. В случае покраснения или уплотнения в месте введения вакцины, необходимо поставить в известность медработника, проводившего прививку.

Перед прививкой ребенка нужно оберегать от контактов с больными. При наличии пищевой аллергии необходимо строго соблюдать диету, не вводить в рацион новые продукты. Такой же тактики нужно придерживаться в течение 5 – 7 дней после прививки.

В день проведения прививки сокращаются прогулки на улице, ограничиваются контакты с другими детьми, рекомендуется не купать ребёнка в течение суток.

После прививки ребёнок нуждается во внимательном отношении к нему со стороны родителей и наблюдении медперсонала поликлиники в установленные сроки. Для обеспечения медицинского наблюдения за ребёнком в случае возникновения немедленной реакции непосредственно после проведения прививки, родителям следует находиться с ребёнком

возле прививочного кабинета в течение 30 минут.

Национальный календарь профилактических прививок в России

Возраст ребёнка	Вакцины
1 сутки	Гепатит В (1-я вакцина)
3-7 дней	Туберкулёт
1 месяц	Гепатит В (2-я вакцина)
2 месяца	Пневмококковая инфекция(1-я вакцина)
3 месяца	Дифтерия, коклюш, столбняк (1-я вакцина), полиомиелит (1-я вакцина)
4,5 месяца	Дифтерия, коклюш, столбняк (2-я вакцина), полиомиелит (2-я вакцина), пневмококковая инфекция (2-я вакцина)
6 месяцев	Дифтерия, коклюш, столбняк (3-я вакцина), полиомиелит (3-я вакцина), гепатитВ (3-я вакцина)
12 месяцев	Корь, краснуха, паротит

Прививая ребенка, Вы защищаете его от инфекционных заболеваний!

Отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего ребенка!

Берегите себя и будьте здоровы!

Студентка 214-9 гр. Чирухина В.А., 2023 г.