Нарушение архитектоники молочной железы при УЗИ: определение, классификация и дифференциальная диагностика

часть 2

Nonmass Findings at Breast US: Definition, Classifications, and Differential Diagnosis

Jihee Choe , Sona A. Chikarmane, Catherine S. Giess

▼ Author Affiliations

Published Online: Mar 3 2020 | <https://doi.org/10.1148/rg.2020190125>

Sections PDF CME

Tools Share

Ординатор кафедры лучевой
диагностики ИПО
Колесникова Нина Владимировна

Красноярск 2021

Протоковая карцинома in situ. УЗИ молочной железы. В-режим

- **Нарушение структуры в виде изолированно расширенных протоков у женщины 72 лет.**

Нарушение архитектоники молочной железы. Акустическая тень. УЗИ в В-режиме

ФИБРОЗ

Женщина 57 лет

- акустическая тень
- Биопсия под контролем УЗИ- фиброз

ИНВАЗИВНАЯ ЛОБУЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА

Женщина 74 года

- образование неправильной формы гетерогенной структуры, с гипо- и гиперэхогенными участками, акустической тенью, нечеткими, неровными контурами

Нарушение архитектоники молочной железы. Акустическая тень

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ

- Фиброз
- Склерозирующий аденоз
- Стеатонекроз

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ

- Десмоплазия
- Вовлечение в опухолевый процесс связок Купера
- Фиброз после проведенной химиотерапии

Лимфогистиоцитарная инфильтрация,
фиброз. УЗИ молочной железы. В-режим

Женщина 40 лет

- **Образование неправильной формы, гетерогенной структуры, гипозоногенное с лучистым контуром**

- ❑ В большинстве случаев (46-90%) изменения в молочной железе относятся к доброкачественным образованиям
- ❑ В 10-54% выявляются злокачественные новообразования
- ❑ Наиболее распространенные нарушения архитектоники (75%) - фиброзно-кистозные изменения
- ❑ Среди злокачественных новообразований встречаются в 11-19% протоковая карцинома *in situ*, либо в 13% случаев инвазивная лобулярная карцинома
- ❑ Нарушение архитектоники при маммографии в 84% случаев – злокачественного характера, в 40% наблюдений - доброкачественные

Атипичная протоковая гиперплазия. Маммография. УЗИ молочной железы. В-режим

проекция

(А) косая

(В) прямая

Женщина 58 лет

(С) продольное сканирование

(D) Поперечное сканирование

- **А,В – правая молочная железа, нарушение архитектоники на 6 часах**
- **С,Д- образование линейной формы, гомогенной структуры, пониженной эхогенности**

Инвазивная протоковая карцинома. УЗИ молочной железы. В-режим

продольное сканирование

поперечное сканирование

Женщина 50 лет

- **УЗИ: зона пониженной эхогенности**

Протоковая карцинома in situ. УЗИ молочной железы. В-режим

продольное сканирование

поперечное сканирование

Женщина 74 года

- **образование неправильной формы с нечеткими контурами гетерогенной структуры, с участками повышенной и пониженной эхогенности**

Протоковая карцинома in situ. Маммография. УЗИ молочной железы. В-режим

проекции

(А) косая

(В) прямая

(С) продольное сканирование

(D) поперечное сканирование

Женщина 69 лет

- **А,В- левая молочная железа - нарушение архитектоники**
- **С,Д- зона пониженной эхогенности**

Люпус-мастит. Маммография. УЗИ молочной железы. В-режим

проекции

(А) косая

(В) прямая

(С) поперечное сканирование

(D) Продольное сканирование

Женщина 67 лет в анамнезе СКВ

- **А,В - очаговая асимметрия в верхне-внутреннем квадранте левой молочной железы**
- **С,Д – зона пониженной эхогенности**

Морфологическое подтверждение диагноза

- ❑ Биопсия под контролем УЗИ - «золотой стандарт»
- ❑ Стереотаксическая биопсия может быть проведена при сомнительных результатах ультразвукового исследования

Корреляция между результатами УЗИ и МРТ молочной железы

- В 40% случаев при УЗИ молочной железы изменения подтверждаются на МРТ, из которых в 97% выявлено нарушение архитектоники
- 95% злокачественных новообразований обнаруженных при УЗИ, подтвердились на МРТ

Лобулярная карцинома. МРТ с контрастированием. УЗИ молочной железы. В-режим

плоскость

(А) сагитальная

(В) аксиальная

(С) поперечное
сканирование

(D) Продольное
сканирование

Женщина 69 лет с мутацией BRCA2 в анамнезе

- **А, В – накопление контраста в левой молочной железе**
- **С, D- округлое образование с нечеткими, ровными контурами гетерогенной структуры с участками повышенной и пониженной эхогенности**

Выводы

- При скрининговом ультразвуковом исследовании может быть выявлено нарушение архитектоники молочной железы как доброкачественного, так и злокачественного характера
- Наличие кальцинатов крайне подозрительно для злокачественного новообразования
- Данные УЗИ необходимо сопоставлять с результатом маммографии и МРТ

Благодарю за внимание!