

Рецензия на реферат по теме: Гипогонадизм.

Гипогонадизм, или тестикулярная недостаточность - патологическое состояние, клиническая картина которого обусловлена снижением в организме уровня андрогенов, характеризуется недоразвитием половых органов, вторичных половых признаков и, как правило, бесплодием. У мужчин среднего возраста без сопутствующей патологии распространенность гипогонадизма составляет 6% . Распространенность гипогонадизма при ожирении и некомпенсированном сахарном диабете может превышать 50%, однако многие случаи остаются недиагностированными. Это приводит к отсутствию своевременного лечения и инвалидизации больных, поскольку гипогонадизм способствует не только появлению половых нарушений и снижению качества жизни, но и возникновению остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы не достичь этих сопутствующих осложнений, следует вовремя начать андрогенную терапию, которая основывается на желании пациента, факторах риска и возможности проведения репродуктивной реабилитации. Пациент должен быть полностью информирован о предполагаемой пользе лечения и побочных эффектах каждого метода лечения.

В данном реферате полностью раскрыта актуальность этой темы, отражена этиология данного заболевания, выражены основные клинические проявления, описаны основные препараты тестостерона, схемы их назначения, указаны принципы ведения больных с гипогонадизмом.

кафедрыной руководитель
Осейров Н.Б. геч 