



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Дата: « ____ » _____ 20__ г. Цикл/дисциплина: Топ. анатомия и оперативная хирургия

Ф.И.О. обучающегося: _____

Курс IV, группа № _____, специальность: « _____ »

ПОДГОТОВКА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЯ К РАБОТЕ

Параметр		Оценка правильности выполнения		
1	Установил иглу в иглодержатель на границе между средней третью иглы и ее ушком.	«+»	«+/-»	«-»
2	Зафиксировал иглу перпендикулярно оси иглодержателя. Острие иглы направлено вверх и влево либо вправо (в зависимости от преобладающей «ведущей» руки). До конца закрыл замок иглодержателя.	«+»	«+/-»	«-»
3	Отрезал нить длиной 20-30 см. Заряженный иглодержатель положил на ладонь левой руки, при этом ушко иглы направлено вверх. Завел нить правой рукой за носик иглодержателя. Вдел нить в ушко иглы. Концы нитей разной длины (длина одного конца соответствует 1/3 длины другого конца).	«+»	«+/-»	«-»
4	Подавал заряженный иглодержатель рукояткой вперед по типу «писчего пера».	«+»	«+/-»	«-»
Достижимый результат: подан готовый к работе иглодержатель				

НАЛОЖЕНИЕ ПРОСТОГО УЗЛОВОГО (КРУГОВОГО) ШВА НА КОЖНУЮ РАНУ. ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ СЛОЖНОГО «ХИРУРГИЧЕСКОГО», «МОРСКОГО», ПРОСТОГО УЗЛОВ

Параметр		Оценка правильности выполнения		
1	Взял иглодержатель, заряженный «режущей» иглой, в кулак правой руки.левой рукой взял хирургический пинцет по типу «писчего пера». Установил иглодержатель параллельно ране. Рану начал ушивать из-под руки.	«+»	«+/-»	«-»
2	Дальний край раны зафиксировал хирургическим пинцетом. Проколлот иглой кожу и подкожно-жировую клетчатку перпендикулярно ране, отступив от ее края на 3-8 мм, захватив в шов все ткани вместе с дном.	«+»	«+/-»	«-»
3	Ближний край раны зафиксировал хирургическим пинцетом, прошил изнутри наружу, отступив от раны на 3-4 мм. Зафиксировал острие иглы пинцетом. Снял иглодержатель. Зафиксировал острие иглы иглодержателем в положении пронации кисти. Вывел иглу из раны.	«+»	«+/-»	«-»
4	Выровнял длину концов нитей над раной. Сформировал сложный «хирургический» узел, сопоставив края раны. Сместил узел в сторону от раны. В состоянии натянутых концов нитей сформировал «морской» узел, протянув их указательными пальцами. Концы нитей отсек на расстоянии 0,5-1 см от узла.	«+»	«+/-»	«-»
5	Приподнял узел хирургическим пинцетом до тех пор, пока над кожей не появится часть нити, скрытая в толще тканей. Пересек эту часть нити ножницами Купера или скальпелем. Извлек нить, подтягивая ее в направлении раны.	«+»	«+/-»	«-»
Достижимый результат: наложен узловой шов на рану кожи.				

ЗНАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Правильно показал и назвал инструмент		Оценка правильности выполнения		
1	Из группы для разъединения тканей	«+»	«+/-»	«-»
2	Из группы для фиксации тканей	«+»	«+/-»	«-»
3	Из группы кровоостанавливающих зажимов	«+»	«+/-»	«-»
4	Из группы для соединения тканей	«+»	«+/-»	«-»
5	Из группы вспомогательного инструментария	«+»	«+/-»	«-»
6	Из группы специального инструментария	«+»	«+/-»	«-»

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУНКЦИЙ, БЛОКАД

Манипуляция <i>(Оценивается только одна манипуляция согласно вопроса из билета)</i>		Оценка правильности выполнения		
Пункция подлопаточного заворота плечевого сустава	Пропальпировал клювовидный отросток лопатки, непосредственно под ним выполнил вкол пункционной иглы. Иглу продвинул кзади по направлению к углу акромиального отростка лопатки.	«+»	«+/-»	«-»
Пункция верхне-латерального заворота локтевого сустава	Придал верхней конечности согнутое положение в локтевом суставе под углом 135 градусов. Пропальпировал головку лучевой кости при супинации и пронации. Выполнил вкол пункционной иглы выше головки лучевой кости, между локтевым отростком и наружным надмыщелком плеча.	«+»	«+/-»	«-»
Пункция переднего верхне-медиального заворота коленного сустава	Сместил надколенник в медиальную сторону. Выполнил вкол пункционной иглы в верхней точке медиального края основания надколенника. Продвинул иглу перпендикулярно оси бедра на глубину 3-4 см до ощущения провала.	«+»	«+/-»	«-»
Пункция переднего заворота тазобедренного сустава	Определил точку вкола: середина условной линии от верхушки большого вертела к середине пупартовой связки. В установленной точке выполнил вкол пункционной иглы, провел её перпендикулярно плоскости бедра до упора в шейку бедра.	«+»	«+/-»	«-»
Пункция реберно-диафрагмального синуса плевральной полости	Определил точку вкола пункционной иглы по средней подмышечной, задней подмышечной или лопаточной линии в VII или VIII межреберье. Зафиксировал кожу, сместил ее по ребру книзу. Провел вкол иглы непосредственно над верхним краем ребра до ощущения провала.	«+»	«+/-»	«-»
Пункция передне-нижнего синуса перикарда по Ларрею	Определил точку, соответствующую месту между мечевидным отростком и хрящом 7 ребра слева. Пункционной иглой сделал прокол в перпендикулярном к коже направлении, до ощущения провала. Наклонил мандрен иглы книзу, продвинул иглу почти параллельно грудине и продвинул ее постепенно кверху до ощущения второго провала.	«+»	«+/-»	«-»
Внутригазовая блокада	Определил точку вкола на расстоянии 1-1,5 см кнутри от верхней передней ости подвздошной кости по межкостистой линии. Выполнил вкол иглы перпендикулярно поверхности тела, продвигая по направлению сверху вниз, спереди назад и снаружи кнутри. При этом срез иглы скользит по внутренней поверхности крыла подвздошной кости. Иглу провел на глубину 10-12 см. до подвздошно-крестцового сочленения.	«+»	«+/-»	«-»
Достижимый результат: выполнена блокада / пункция сустава.				

ИТОГО ОШИБОК:

каждое нарушение последовательности алгоритма оценивается в 0,5 ошибки.

«+» – нет ошибки; «+/-» – 0,5 ошибки; «-» – одна ошибка.

«Отлично» – 15-16 «+»	СУММА правильных ответов	
«Хорошо» – 12,5-14,5 «+»	О Ц Е Н К А (прописью)	
«Удовлетворительно» – 10-12 «+»		

Экзаменатор _____
(Ф.И.О.)

_____ (подпись)